Rifinah



卫非宁是两种药物(利福平和异烟肼)的复合片剂。

服用卫非宁 (Rifinah) 前

告诉您的医生以下信息:

- 您正在使用的所有其它药物，包括您在社区药店中购买的任何非处方药
- 对其它任何药物的任何既往过敏史
- 是否曾有患任何类型的肝病

当您服用卫非宁时

程序与服用卫非特相同

副作用

与卫非特相同

保护你的家人和朋友远离结核病 – 全程服药

请记住，在整个治疗期间，抗结核护士随时为您提供帮助和建议。如果治疗期间感觉不适或对药物有任何不确定之处，请联系抗结核护士。

您的抗结核护士是:

_____

您的医院医生是:

_____

联系电话:

_____

电子邮件:

_____

TB Alert 是一家独特的慈善机构，致力于在英国提高人们对结核病的认识，通过为患者提供信息，支持 NHS 的工作。我们资助发展中国家的抗结核项目，确保所有患者都得到合适的治疗。在您的支持下，我们可以对全世界的抗结核工作产生积极的影响，挽救更多的生命。

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
电话: 01273 234030

如需了解更多信息或想要获取此宣传册，
请联系 01273 234 770 (仅办公时间)。

如欲捐赠或成为志愿者，
请拨打 01273 234 784 (仅办公时间)。

或登录我们的网站www.tbalert.org

此宣传册中有关结核病治疗的信息不能替代抗结核护士/医生或其他医务人员的专业知识和判断。此宣传册中包含的信息不能作为TB治疗的决定。有关治疗的问题和相关事项应直接咨询医务人员。

最初的编制工作由西北伦敦TB网完成。

TB alert
for a future without tuberculosis

卫非特, 乙胺丁醇, 吡嗪酰胺和卫非宁 (Rifater,Ethambutol, Rifinah)



NHS

切记将所有药物放在儿童无法触及的安全场所！

Rifater



卫非特是三种药物（利福平，异烟肼和吡嗪酰胺）的复合片剂。

服用卫非特 (Rifater) 前

告诉您的医生以下信息：

- 您正在使用的所有其它药物，包括您在社区药店中购买的任何非处方药
- 对其它任何药物的任何既往过敏史
- 是否曾有患任何类型的肝病

当您服用卫非特时

空腹时吸收最好。
进餐前的半小时前服药。您的医生或护士会与您讨论一天中的最佳服药时间。

副作用

与其它所有药物一样，卫非特可能会产生一些副作用：

- 胃部不适，如恶心（感觉想吐）、呕吐和腹泻
- 流感样症状，如寒战、发热、眩晕和骨痛
- 黄疸（皮肤或眼睛变黄）。如果您发现黄疸，应停用所有药物，并立即就诊
- 皮疹和瘙痒
- 月经紊乱
- 外周神经病变（手指或足趾针刺感）
- 机体分泌物（尿液、唾液、精液、阴道分泌物）会变为桔红色。这是正常现象，无需担忧。如果服用卫非特前尿色变深，请告诉医生或护士。隐形眼镜也可能变色。
- 激素类避孕药（口服，植入或其它）的有效性会下降。您将需要采用其它避孕措施或增加用避孕措施；具体可咨询医生或护士。

Ethambutol

服用乙胺丁醇 (Ethambutol)前

告诉医生以下信息：

- 您正在使用的所有其它药物，包括您在社区药店中购买的任何非处方药
- 对其它任何药物的任何既往过敏史

服用乙胺丁醇时

乙胺丁醇可以在用餐前或餐后服用。
医生或护士会与您讨论服用乙胺丁醇的最佳时间。

副作用：

极少数情况下，乙胺丁醇会引起视力障碍(视力模糊和红色/绿色障碍)。医生或护士会安排您在开始服用乙胺丁醇前进行简单的眼科检查。
如果您在服用乙胺丁醇期间出现上述视力障碍，请停用药物，并立即通知医生或护士。

Pyrazinamide

服用吡嗪酰胺 (Pyrazinamide) 前

告诉医生以下信息：

- 您正在使用的所有其它药物，包括您在社区药店中购买的任何非处方药
- 对其它任何药物的任何既往过敏史
- 是否曾患有任何肝病

服用吡嗪酰胺时

吡嗪酰胺可以在用餐前或餐后服用。医生或护士会与您讨论服用吡嗪酰胺的最佳时间。

副作用

与其它所有药物一样，吡嗪酰胺可能会产生一些副作用：

- 胃部不适，如恶心（感觉想吐）、呕吐和腹泻
- 流感样症状，如寒战、发热、眩晕和骨痛
- 黄疸（皮肤或眼睛变黄）。如果您发现黄疸，应停用所有药物，并立即就诊
- 皮疹和瘙痒