



ریفاتر، اتامبوتول، پیرازینامید و ریفینا (Rifater, Ethambutol, Pyrazinamide & Rifinah)

تعرق
ااهش وزن ب
تب!! تعرق زیاد
باز در شب همراه
تب!! بی حالی!! تب!! بی حالی!!
به همراه یا بدون سرفه غدد متورم تب!!
تب!! تعرق زیاد در شب غدد متورم
تب!! کاهش وزن بی هیچ دلیل اتب!! تعرق زیاد در شب
تعرق زیاد در شب به همراه یا بدون
سرفه غدد متورم بی حالی!! تب!! بی
تب!! تعرق زیاد در تب!! تب!!

www.tbalert.org 01273 234 770 (فقط ساعات اداری) تماس بگیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت نسخه هایی از این بروشور لطفاً با 01273 234 770 (فقط ساعات اداری) تماس بگیرید. جهت اهدای کمکهای مالی و داوطلبانه جهت یاری رساندن به TB Alert لطفاً با 01273 234 784 (فقط ساعات اداری) تماس بگیرید. یا به وب سایت ما به آدرس www.tbalert.org مراجعه نمایید.



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
تلفن: 01273 234030

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت نسخه هایی از این بروشور لطفاً با 01273 234 770 (فقط ساعات اداری) تماس بگیرید.
جهت اهدای کمکهای مالی و داوطلبانه جهت یاری رساندن به TB Alert لطفاً با 01273 234 784 (فقط ساعات اداری) تماس بگیرید.
یا به وب سایت ما به آدرس www.tbalert.org مراجعه نمایید.

اطلاعاتی که در این بروشور در مورد درمان سل ارائه شده به قصد ایجاد جایگزینی برای دانش تخصصی مهارت و تشخیص پزشک/پرستار سل شما یا دیگر متخصصین سلامت تهیه نشده است. توجه داشته باشید که اطلاعات این بروشور با هدف کمک به تصمیم گیری در مورد تشخیص یا درمان سل ارائه نمی شوند. سوالات و دغدغه های خود در مورد درمانتان را می بایست با یک متخصص سلامت مطرح کنید.

اصل کار تهیه بروشور توسط شبکه سل شمال غرب لندن

از اعضای خانواده و دوستانتان در مقابل سل محافظت کنید- همه داروهای سل خود را مصرف

به یاد داشته باشید که پرستار سل (TB Nurse) در اینجاست تا در طول دوره درمان به شما کمک کرده و مشاوره دهد. لطفاً اگر حین دوره درمان احساس ناخوشی دارید و یا در مورد چیزی مربوط به داروهایتان اطمینان کامل ندارید با پرستار سل خود تماس بگیرید.


نام پرستار سل شما:

نام پزشک بیمارستان شما:

شماره تماس:

ایمیل:

Rifinah



ریفینا

ریفینا ترکیبی از دو دارو (ریفامپیسین و ایزونیاژید) است که به صورت یک قرص عرضه می شود.

قبل از مصرف ریفینا

موارد زیر را با پزشکتان مطرح کنید:

- تمامی داروهایی که در حال حاضر مصرف می کنید شامل هر دارویی که در داروخانه محله تان بدون نسخه پزشک خریداری کنید
- هر نوع الرژی به دیگر داروها
- اینکه آیا تا کنون بیماری کبد داشته اید یا خیر.

مصرف ریفینا

به همان شیوه مصرف ریفاتر

عوارض جانبی

مشابه عوارض ریفاتر

Pyrazinamide



قبل از مصرف پیرازینامید

موارد زیر را با پزشکتان مطرح کنید:

- تمامی داروهایی که در حال حاضر مصرف می کنید شامل هر دارویی که در داروخانه محله تان بدون نسخه پزشک خریداری کنید
- هر نوع آلرژی به دیگر داروها
- اینکه آیا تا کنون بیماری کبد داشته اید یا خیر

مصرف پیرازینامید

قبل و بعد از صرف غذا می توانید از پیرازینامید استفاده کنید. پزشک یا پرستارتان در مورد بهترین زمان مصرف اتامبوتول با شما صحبت خواهد کرد.

عوارض جانبی

- پیرازینامید، همانند همه داروهای دیگر، ممکن است عوارض جانبی داشته باشد:
- ناراحتی معده مانند حالت تهوع (احساس نامطبوع)، استفراغ و اسهال
 - علائمی مشابه علائم بیماری آنفلوآنزا مانند احساس سردی در بدن، تب، گنجی و درد استخوان ها
 - یرقان (زرد شدن پوست و چشم ها)، اگر با چنین حالتی مواجه شدید لطفاً مصرف هر نوع دارویی را متوقف کنید و فوراً موضوع را به پزشک اطلاع دهید.
 - جوش های پوستی و خارش

- ترشحات بدن (ادرار، بزاق، منی، مایعات آلت تناسلی زن) به رنگ نارنجی متمایل به قرمز. این مساله طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد؛ اگر قبل از مصرف دوز ریفاتران، ادرارتان به رنگ تیره بود مساله را با پزشک یا پرستارتان مطرح کنید. همچنین لنزهای تماسی تان ممکن است بی رنگ شوند
- کارایی داروهای هورمونی ضد بارداری (خوراکی، ایمپلنت یا کاشته شده و غیره) کاهش می یابد. اگر برای مقاصد ضد بارداری به روش های جایگزین یا داروهای دیگری نیاز دارید، از پزشک یا پرستارتان مشورت بگیرید

Ethambutol



قبل از مصرف اتامبوتول

موارد زیر را با پزشکتان مطرح کنید:

- تمامی داروهایی که در حال حاضر مصرف می کنید شامل هر دارویی که در داروخانه محله تان بدون نسخه پزشک خریداری کنید
- هر نوع آلرژی به دیگر داروها

مصرف اتامبوتول

قبل و بعد از صرف غذا می توانید از اتامبوتول استفاده کنید. پزشک یا پرستارتان در مورد بهترین زمان مصرف اتامبوتول با شما صحبت خواهد کرد.

عوارض جانبی:

اتامبوتول به ندرت ممکن است باعث اختلالات بینایی (دید ناواضح و اختلال در تشخیص رنگهای قرمز/سبز) شود. قبل از آغاز مصرف اتامبوتول، پزشک یا پرستارتان ترتیب انجام یک تست چشم پزشکی ساده را فراهم می آورند. اگر به هنگام مصرف اتامبوتول اختلالات بینایی مذکور در شما پدیدار شد، لطفاً از ادامه مصرف آن خودداری کرده و فوراً پزشک یا پرستارتان را در جریان موضوع قرار دهید.

Rifater



ریفاتر ترکیبی از سه دارو (ریفامپیسین، ایزونیاژید و پیرازینامید) است که به صورت یک قرص عرضه می شود.

قبل از مصرف ریفاتر

موارد زیر را با پزشکتان مطرح کنید:

- تمامی داروهایی که در حال حاضر مصرف می کنید شامل هر دارویی که در داروخانه محله تان بدون نسخه پزشک خریداری کنید
- هر نوع آلرژی به دیگر داروها
- اینکه آیا تا کنون بیماری کبد داشته اید یا خیر

مصرف ریفاتر

ریفاتر در معده خالی به بیشترین حد ممکن در بدن جذب می شود. ریفاتر را نیم ساعت قبل از صرف غذا مصرف کنید. پزشک یا پرستارتان در مورد بهترین وقت استفاده از ریفاتر در روز با شما صحبت خواهد کرد.

عوارض جانبی

ریفاتر، همانند همه داروهای دیگر، ممکن است عوارض جانبی داشته باشد:

- ناراحتی معده مانند حالت تهوع (احساس نامطبوع)، استفراغ و اسهال
- علائمی مشابه علائم بیماری آنفلوآنزا مانند احساس سردی در بدن، تب، گنجی و درد استخوان ها
- یرقان (زرد شدن پوست و چشم ها)، اگر با چنین حالتی مواجه شدید لطفاً مصرف هر نوع دارویی را متوقف کنید و فوراً موضوع را به پزشک اطلاع دهید.
- جوش های پوستی و خارش
- اختلالات قاعدگی (پریودی)
- آسیب به تارهای دستگاه اعصاب جانبی (احساس درد سوزن در انگشتان دست و پا)