



آیا دریافت BCG در سن میانسالی یا به هنگام مسافرت فایده ای دارد؟

تحقیقات نشان می دهد که BCG بر افراد بالای 35 سال تاثیر اندکی دارد. تنها به افرادی که زیر 35 سال سن دارند و در مشاغل حساس و با ریسک بالا فعالیت می کنند مانند افرادی که در مراکز درمانی، مراقبت از سالمندان، مسافرخانه های مخصوص بی خانمان ها و پناهندگان، آزمایشگاه ها، زندان ها، و مراکز دامپزشکی کار می کنند توصیه می شود که BCG دریافت کنند. به کودکانی که زیر 16 سال سن دارند و BCG دریافت نکرده اند و قرار است از کشوری با آمار بالای سل بازدید کنند / یا در آن اقامت نمایند، توصیه می شود که آزمایش پوست انجام دهند تا مشخص شود که آیا به BCG نیاز دارند یا خیر. (معمولا BCG مخصوص مسافرت و آزمایش های مربوط به آن را به صورت خصوصی دریافت می کنید).

آیا همه به سل مبتلا می شوند؟

هر فردی ممکن است به سل مبتلا شود (یکی از اعضای کابینه بریتانیا، چند خواننده مشهور و یک کشیش اعظم در زمره مبتلایان به سل قرار داشته اند!) اما افرادی که در شرایط بدی زندگی می کنند یا رژیم غذایی نامناسبی دارند (مانند بی خانمان ها یا افرادی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند) و افرادی که به بیماری های دیگر- مخصوصا HIV- مبتلا هستند بیش از دیگران در معرض ابتلا به بیماری قرار دارند.

اگر در مورد سل نگران هستم به چه کسی باید صحبت کنم؟


اگر نگران هستید که خودتان یا فردی که وی را می شناسید نشانه های بیماری سل را داشته باشید، می بایست با پزشکتان راجع به آن صحبت کنید.

ممکن است فردی مجدداً به سل مبتلا شود؟

پاسخ این سوال بله است. - ممکن است، پس اگر تردیدی دارید، لطفاً از پزشک عمومی خود مشاوره بگیرید.

بیماری سل چه قدر شایع است؟

سل در کشورهای در حال توسعه ای که مردم آن به درمان موثر دسترسی ندارند یا قادر به پرداخت هزینه های درمان نیستند شیوع زیادی دارد. برخی افراد آن را لکه ننگ و شوم می دانند و حتی از پیگیری جهت درمان خودداری می کنند.



این قرص ها در موارد نادر ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند از جمله:

- ⊙ جوش
 - ⊙ حالت تهوع
 - ⊙ احساس مورمور و سوزش
 - ⊙ یرقان (زردی پوست یا چشمها). اگر چنین مواردی رخ داد. مصرف داروی سل را متوقف نموده و فوراً موضوع را با پزشکستان مطرح کنید.
- در صورت بروز چنین مشکلاتی، پزشک یا پرستار سل خود را از موضوع آگاه کنید.

برای افرادی که در تماس نزدیک با بیمار بوده اند چه اتفاقی می افتد؟

پرستار متخصص سل از شما می خواهد تا فهرستی از افرادی که وقت زیادی را با آنان سپری کرده اید در اختیارش قرار دهید. از این افراد درخواست می شود تا در یک کلینیک سینه حاضر شوند تا مورد معاینه قرار گیرند. ممکن است آزمایش خون، یا آزمایش پوست، و/ یا عکسبرداری اشعه X از سینه ایشان انجام شود.

آیا امکان پیشگیری از ابتلا به سل وجود دارد؟

واکسنی وجود دارد که BCG نام دارد. اگرچه این واکسن در همه موارد کارساز نیست اما در شکل های حادثر و خطرناکتر سل، مانند سل مننژیتی و برای کودکان با سنین پایین تر بیشترین کارایی را دارد. واکسن BCG پرمصرفترین واکسنی است که بر روی کره زمین مورد استفاده قرار می گیرد؛ با این وجود 9 میلیون نفر در سال (که اغلبشان قبلاً واکسن BCG دریافت کرده اند) به بیماری سل مبتلا می شوند. واکسن های جدید در حال ساخت است. امروزه در بریتانیا، BCG به نوزادان که در معرض خطر بیشتری قرار دارند و برخی از میانسالان که خطر ابتلایشان به بیماری با توجه به وضعیتشان بالاست ارائه می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با 0845 456 0995 تماس بگیرید تا بتوانید سفارش دریافت برونشور BCG را به ما ارائه دهید.