

- Vous pouvez vous rendre dans certains services d'urologie sans rendez-vous mais dans d'autres il vous faudra prendre un rendez-vous au préalable.
- Vous n'avez pas besoin de lettre de la part d'un autre médecin.
- Ces services sont dotés d'une réglementation spéciale qui impose une confidentialité très stricte.
- Votre dossier médical ne sort jamais de l'enceinte du service et il ne peut être consulté que le personnel qui y travaille.
- Les résultats ne seront pas divulgués à votre médecin généraliste.
- Vous n'êtes pas obligé de donner vos vrais nom, date de naissance ou adresse, mais soyez sûr de vous souvenir des coordonnées que vous avez données.
- Si vous souhaitez effectuer le test auprès d'une autre clinique, contacter gratuitement la ligne d'assistance nationale contre le sida (National AIDS Helpline) au 0800 567 123.
- Vous pouvez également effectuer ce test auprès de votre médecin généraliste.
- Cependant, votre médecin généraliste devra peut-être divulguer un résultat séropositif aux compagnies d'assurance vie ou santé si vous déposez une demande. Si ceci vous préoccupe, il est mieux de faire le test auprès du service d'urologie.



Pourquoi faire le lien entre le sida et la tuberculose?

La majorité des personnes atteintes de la tuberculose au Royaume-Uni ne sont pas également séropositives. Cependant, dans certains pays, le sida et la tuberculose vont souvent de pair. Le sida endommage le système de défense de l'organisme ce qui permet à la tuberculose de s'implanter plus facilement.

Certaines personnes contractent la tuberculose lors d'un long séjour dans un pays où la tuberculose et le sida sont très fréquents. Par conséquent, ces deux maladies sont très liées. Toute personne atteinte d'une des deux maladies peut avoir été exposé à l'autre.

Qu'est-ce que le VIH/SIDA?

- ⊙ VIH signifie Virus de l'Immunodéficience Humaine et SIDA signifie Syndrome d'Immunodéficience Acquise.
- ⊙ Le VIH est une infection qui endommage le système de défense de l'organisme et permet aux autres maladies de se développer, surtout les infections.
- ⊙ Lorsque certaines autres maladies se développent au sein du personne infectée par le VIH, cette personne a alors le sida.

Le VIH est-il fréquent?

Le VIH est répandu dans le monde entier. Mais il y a des régions (telles que l'Afrique sub-saharienne, le sud de l'Asie et l'Europe de l'Est) où le VIH est plus fréquent.

Au Royaume-Uni, il est estimé que 30 000 personnes sont atteintes du VIH et le nombre continue d'augmenter avec plus de 6500 personnes testées positives au VIH pour la première fois chaque année. À l'échelle de la planète, les rapports sexuels entre un homme et une femme représentent la manière la plus commune de contracter le VIH. Cependant, le nombre de nouveaux cas recensés entre deux hommes qui ont un rapport sexuel reste élevé.

Existe-t-il une cure contre le VIH et le SIDA?

Les effets du VIH peuvent être contrôlés et même inversés par des médicaments contre le VIH. Pour le moment, il n'existe pas de cure contre le VIH ou le SIDA. Cependant, la recherche montre que la majorité des gens qui prennent ces médicaments contre le VIH vivent plus longtemps et se sentent mieux. Si vous savez que vous êtes séropositif, vous pouvez prendre des mesures pour réduire le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes.

Comment le VIH se transmet-il?

- ⊙ En ayant un rapport sexuel (vaginal ou anal) sans préservatif. La pratique non protégée du sexe oral présente également quelques risques.
- ⊙ D'une mère à son bébé lors de la grossesse, de la naissance ou de l'allaitement.
- ⊙ En partageant des aiguilles, seringues ou autres accessoires pour l'injection de drogue.
- ⊙ Lors d'un traitement avec du sang ou des produits sanguins contaminés.

Le test de dépistage du VIH

Qu'implique le test?

Une petite prise de sang sera faite au niveau de votre bras. L'échantillon sera ensuite envoyé à un laboratoire puis testé.

On vous a peut-être déjà fait une prise de sang à la clinique mais nous ne pouvons faire un test de dépistage du VIH qu'avec votre consentement et permission. Tous les tests du VIH sont gratuits.

Dans combien de temps, aurai-je les résultats?

Il faut souvent compter trois jours ouvrables pour avoir les résultats. Quels que soient les résultats, ils vous seront remis en personne par un professionnel de santé. Les résultats ne peuvent être donnés par téléphone et une version papier du résultat n'est souvent pas donnée aux patients.

Que m'indiquent les résultats?

Séronégatif

Cela signifie que vous n'avez pas le VIH à moins que vous ayez été exposé au VIH durant les trois précédant le test. Si vous avez été exposé durant les trois derniers mois, le test ne l'a peut-être pas détecté (période de latence). Il peut vous être conseillé de refaire un test 3 mois après la dernière fois que vous étiez à risque d'être exposé au VIH.

Séropositif

Vous avez le VIH. Le résultat est vérifié avec un second test de dépistage du VIH (une erreur est très peu probable). Vous aurez un rendez-vous confidentiel avec un spécialiste du VIH/SIDA qui vous donnera des informations concernant le VIH/SIDA, vous aidera à accepter le diagnostic et prescrira le traitement requis.

Qui va connaître les résultats?

Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront connus que de vous et du personnel qui vous suit. Personne d'autre n'aura connaissance des résultats sans votre permission. Les résultats ne sont pas divulgués à votre compagne ou compagnon, aux membres de votre famille, à vos amis, à votre employeur, à votre propriétaire, au gouvernement, au ministère de l'Intérieur ou aux services de l'immigration.

Où puis-je faire un test de dépistage du VIH ou discuter du dépistage?

Vous pouvez faire le test à la clinique spécialisée dans la tuberculose mais il y a également d'autres endroits où vous pouvez faire le test ou discuter des inquiétudes que vous pourriez avoir.