

Site internet : www.tbsurvivalproject.org

Notes:

Souvenez-vous bien que l'infirmière spécialisée (en tuberculose) est là pour vous aider et vous offrir des conseils tout au long de votre traitement. Veuillez contacter votre infirmière spécialisée si vous ne vous sentez pas bien lors de votre traitement ou s'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr par rapport à vos médicaments.

Votre infirmière spécialisée est :

Votre médecin hospitalier est :

Contact :

Adresse e-mail:



Travail de développement original par North West London TB Network

Société à responsabilité limitée par garantie. Immatriculée en Angleterre : n°3065528 Association caritative immatriculée : n°1071866 Design : worksong. Londres 020 8352 8300



Tuberculose multirésistante (MDR TB)

[illegible]

Qu'est-ce-que la tuberculose?

La tuberculose est une infection bactérienne qui atteint le plus fréquemment les poumons mais qui peut toucher n'importe quelle partie du corps telle que le cerveau, les glandes lymphatiques, les reins et les os.

Comment la tuberculose se transmet-elle?

Lorsqu'une personne atteinte de tuberculose pulmonaire tousse, les germes peuvent se propager dans l'air sous forme de petites gouttelettes que d'autres personnes peuvent respirer. Les personnes les plus à risque sont celles qui vivent sous le même toit qu'une personne atteinte de tuberculose.

Suis-je contagieux?

Toutes les personnes atteintes de tuberculose ne sont pas contagieuses. Vous êtes contagieux seulement si vous êtes atteint de tuberculose aux niveaux des poumons ou de la gorge et que vous toussiez et rejetez des germes tuberculeux (ce qui s'appelle un frottis positif). Vous n'êtes pas contagieux si vous avez la tuberculose dans une autre partie de votre corps. Votre médecin ou votre infirmière peut vous fournir de plus amples informations.

Qu'est-ce que la tuberculose multirésistante (MDR TB)?

La tuberculose multirésistante se développe quand les germes tuberculeux résistent aux deux médicaments les plus efficaces normalement utilisés pour traiter la tuberculose. Cela signifie que ces médicaments ne seront pas efficaces étant donné qu'ils ne peuvent plus tuer la bactérie tuberculeuse.

Quand soupçonnez-vous que quelqu'un est atteint de tuberculose multirésistante ?

Des échantillons qui contiennent des germes tuberculeux peuvent être testés en laboratoire afin d'établir s'ils seront tués par divers médicaments. S'ils ne le sont pas, il est probable que le patient ne guérira pas à l'aide des médicaments habituels et cela laisse supposer un cas de tuberculose multirésistante.

Pourquoi les gens peuvent contracter une tuberculose multirésistante ?

1. La tuberculose peut devenir résistante durant le traitement si celui-ci était pour une raison ou une autre inadéquate, par exemple :
 - ⊙ Si le patient ne prend pas les médicaments régulièrement comme prescrit ou arrête le traitement avant la fin.
 - ⊙ Si le patient ne peut complètement absorber les médicaments, par exemple, à cause de vomissements.
 - ⊙ Si les médicaments ne sont pas prescrits ou préparés correctement.
 - ⊙ Si les médicaments sont de mauvaise qualité.
2. La tuberculose peut être résistante depuis le début si la personne à l'origine de la contagion était atteinte de tuberculose multirésistante.

La tuberculose multirésistante n'est pas plus contagieuse que la tuberculose ordinaire mais les médicaments utilisés pour la combattre sont moins efficaces et sont à prendre pendant bien plus de temps. Une personne atteinte de tuberculose multirésistante est donc contagieuse plus longtemps qu'une personne atteinte de tuberculose sensible aux médicaments classiques (tuberculose sensible aux médicaments).

Pourquoi la tuberculose multirésistante pose problème?

La tuberculose multirésistante n'est pas plus contagieuse que la tuberculose sensible aux médicaments mais elle est plus difficile à soigner.

Les médicaments utilisés pour traiter la tuberculose multirésistante présentent de plus nombreux effets secondaires et sont moins efficaces que les médicaments utilisés contre la tuberculose sensible aux médicaments. Cela signifie que les patients atteints de tuberculose multirésistante nécessitent un traitement qui est plus long et ils peuvent être plus malades. Il est également plus probable qu'ils soient admis à l'hôpital pour recevoir un traitement.

Pendant combien de temps serai-je contagieux?

Cela dépend de la manière dont votre organisme réagit aux médicaments qui vous ont été prescrits. Chaque cas de tuberculose multirésistante est différent.

Étant donné que la tuberculose est résistante aux médicaments ordinaires, vous pouvez être contagieux pendant de nombreuses semaines, voire des mois.

Combien de temps durera le traitement?

Une série de médicaments contre la tuberculose multirésistante dure au moins six mois. Le traitement contre la tuberculose multirésistante peut durer 18 mois ou plus.