

Rifater



Rifater est une combinaison de trois médicaments (Rifampicin, Isoniazid et Pyrazinamide) dans un seul comprimé.

Avant de prendre Rifater

Informez votre médecin de :

- ⊙ Tous les autres médicaments que vous prenez, y compris ceux que vous achetez sans ordonnance dans une pharmacie
- ⊙ Tout antécédent d'allergie à d'autres médicaments
- ⊙ Si vous avez eu une maladie du foie

Prendre Rifater

Rifater est mieux absorbé si vous avez l'estomac vide. Rifater est à prendre une demi-heure avant de manger. Votre médecin ou infirmière discutera avec vous du moment de la journée le plus approprié pour prendre Rifater.

Effets secondaires

- ⊙ Mal de ventre tel que la nausée (envie de vomir), vomissement et diarrhée
- ⊙ Les symptômes de la fièvre tels que des frissons, fièvre, étourdissement et douleurs aux niveaux des os
- ⊙ Jaunisse (jaunissement de la peau ou des yeux). Si cela se produit, veuillez arrêter de prendre tous vos médicaments et consulter un médecin immédiatement
- ⊙ Rougeurs et démangeaisons
- ⊙ Perturbation des règles
- ⊙ Névropathie périphérique (sensation de fourmis aux niveaux des doigts et des orteils)

- ⊙ Les sécrétions de l'organisme (urine, salive, sperme, fluide vaginal) présenteront une couleur orange-rouge. Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter. Si votre urine est d'une couleur foncée avant de prendre votre dose de Rifater, veuillez en informer votre médecin ou infirmière. Les lentilles de contact peuvent également se décolorer.
- ⊙ L'efficacité des méthodes de contraceptions hormonales (orale, implants ou autre) est réduite. Vous devrez opter pour une autre méthode de contraception ou une méthode complémentaire ; veuillez demander des conseils auprès de votre médecin ou infirmière.

Ethambutol



Avant de prendre Ethambutol

Informez votre médecin de :

- ⊙ Tous les autres médicaments que vous prenez, y compris ceux que vous achetez sans ordonnance dans une pharmacie
- ⊙ Tout antécédent d'allergie à d'autres médicaments

Prendre Ethambutol

Ethambutol peut se prendre avant ou après manger. Votre médecin ou infirmière discutera avec vous du moment de la journée le plus approprié pour prendre Ethambutol.

Effets secondaires :

Ethambutol peut rarement causer des perturbations au niveau de la vue (images floues et confusions entre le rouge et le vert).

Votre médecin ou infirmière vous prendra un rendez-vous pour qu'un simple test de la vue soit effectué avant de commencer à prendre l'Ethambutol. Si vous développez les problèmes de vue cités ci-dessus lors de la prise d'Ethambutol, veuillez arrêter de le prendre et informez-en votre médecin ou infirmière immédiatement.

Pyrazinamide



Avant de prendre Pyrazinamide

Informez votre médecin de :

- ⊙ Tous les autres médicaments que vous prenez, y compris ceux que vous achetez sans ordonnance dans une pharmacie
- ⊙ Tout antécédent d'allergie à d'autres médicaments
- ⊙ Si vous avez eu une maladie du foie

Prendre Pyrazinamide

Pyrazinamide peut se prendre avant ou après manger. Votre médecin ou infirmière discutera avec vous du moment de la journée le plus approprié pour prendre Pyrazinamide.

Effets secondaires

Comme tous les autres médicaments, Pyrazinamide peut provoquer des effets secondaires :

- ⊙ Mal de ventre tel que la nausée (envie de vomir), vomissement et diarrhée
- ⊙ Les symptômes de la fièvre tels que des frissons, fièvre, étourdissement et douleurs aux niveaux des os
- ⊙ Jaunisse (jaunissement de la peau ou des yeux). Si cela se produit, veuillez arrêter de prendre tous vos médicaments et consulter un médecin immédiatement
- ⊙ Rougeurs et démangeaisons