

Σημειώσεις:

Email :



Το αρχικό σχέδιο ανάπτυξης έγινε από το Δίκτυο του οργανισμού TB Alert στο Βορειοδυτικό Λονδίνου.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

Πολυφαρμακευτική Αντοχή στη Φυματίωση (MDR TB)

...ουσεις Με η
 ...υρετός!!
 ...Αδένες Πυρ...!! Ακα...
 ...Πυρετός!! Ακα...
ράρους / ...νος!! Πυρ...
ουσεις Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! ... Ακατάσχετες ν... επιδρώσεις
 ...κατά...ες νυχτερινές επιδρώσεις Μ...
 ...θαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτε...
 ...Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμέν...
 ...Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτε...
 ...Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετό...
 ...Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές επιδρώσεις

Τι είναι η Φυματίωση;

Η φυματίωση είναι μια βακτηριακή μόλυνση, που παρατηρείται κυρίως στους πνεύμονες αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλα μέρη του σώματος όπως ο εγκέφαλος, οι λεμφαδένες, οι νεφροί και τα οστά.

Πώς μεταδίδεται;

Όταν κάποιος με πνευμονική Φυματίωση βήξει ή φταρνιστεί το μικρόβιο μπορεί να περάσει στον αέρα σε μικρά σταγονίδια και έτσι άλλα άτομα μπορούν να το εισπνεύσουν. Οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κολλήσουν φυματίωση είναι αυτοί που ζουν στο ίδιο σπίτι ή διαμέρισμα με το άτομο που πάσχει από Φυματίωση.

Είμαι μολυσματικός/ή;

Δεν είναι όλοι οι ασθενείς με Φυματίωσης μολυσματικοί. Είστε μολυσματικοί μόνο εάν έχετε πνευμονική Φυματίωση ή Φυματίωση του λάρυγγα και βήχετε (αυτό ονομάζεται θετικό στίγμα). Δεν είστε μολυσματικός για άλλους ανθρώπους εάν έχετε φυματίωση σε άλλο σημείο του σώματος εκτός από τους πνεύμονες και το λάρυγγα. Ο ιατρός σας μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Τι είναι η πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση (MDR TB);

Η πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση αναπτύσσεται όταν το μικρόβιο της Φυματίωσης γίνεται ανθεκτικό στα δύο πιο ισχυρά φάρμακα που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της Φυματίωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα δε θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά αφού δε θα μπορούν πλέον να σκοτώσουν τα βακτήρια της Φυματίωσης.

Πότε υποπτεύεσθε ότι κάποιος πάσχει από πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση;

Θα εξεταστούν στο εργαστήριο δείγματα που περιέχουν μικρόβια Φυματίωσης για να διαπιστωθεί εάν μπορούν να σκοτωθούν από τα διάφορα φάρμακα. Εάν δεν μπορούν, είναι πιθανό ο ασθενής να μη θεραπευτεί με τα συνηθισμένα αντιφυματικά φάρμακα και αυτό μπορεί να είναι δείγμα πολυφαρμακευτικής αντοχής στη Φυματίωση.

Γιατί πάσχουν οι άνθρωποι από πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση;

1. Η Φυματίωση μπορεί να γίνει ανθεκτική κατά τη θεραπεία εάν η θεραπευτική αγωγή που του χορηγήθηκε ήταν για κάποιο λόγω ανεπαρκής, για παράδειγμα:

- Εάν ο ασθενής δε λαμβάνει την φαρμακευτική του αγωγή τακτικά όπως του έχει οριστεί ή δεν ολοκληρώσει τη θεραπεία.
- Εάν ο ασθενής δεν μπορεί πλήρως να αφομοιώσει τα φάρμακα, για παράδειγμα λόγω εμετού.
- Εάν τα φάρμακα δεν έχουν συνταγογραφηθεί ή χορηγηθεί κατάλληλα.
- Εάν τα φάρμακα είναι χαμηλής ποιότητας.

2. Η Φυματίωση μπορεί να είναι ανθεκτική εξ' αρχής επειδή ο ασθενής πάσχει από πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση.

Η πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση δεν είναι περισσότερο μολυσματική από τη συνηθισμένη Φυματίωση αλλά η φαρμακευτική της αγωγή είναι λιγότερη αποτελεσματική και πρέπει να λαμβάνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, ένας ασθενής με πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση είναι περισσότερο χρόνο μολυσματικός από ότι ένας ασθενής με Φυματίωση που ανταποκρίνεται στη συνήθης φαρμακευτική αγωγή (Φυματίωση ανταποκρινόμενη σε φαρμακευτική αγωγή).

Γιατί είναι η πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση πρόβλημα;

Η πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση δεν είναι περισσότερο μολυσματική από τη Φυματίωση που ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι πιο δύσκολο να θεραπευτεί.

Τα φάρμακα που χορηγούνται στη θεραπεία της φαρμακευτικής αντοχής στη Φυματίωση έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα φάρμακα που χορηγούνται στη Φυματίωση που ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που πάσχουν από πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση χρειάζονται θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μπορεί να νοσήσουν για περισσότερο. Είναι επίσης πιο πιθανό να εισαχθούν σε νοσοκομείο για θεραπεία.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα είμαι μολυσματικός/ή;

Αυτό θα εξαρτηθεί από την φαρμακευτική αγωγή που σας χορηγήθηκε και κάθε περίπτωση πολυφαρμακευτικής αντοχής στη Φυματίωση είναι διαφορετική.

Επειδή η Φυματίωση είναι ανθεκτική στη συνηθισμένη φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είστε μολυσματικοί για πολλές εβδομάδες ακόμα και μήνες.

Για πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να λαμβάνω τη θεραπεία;

Η θεραπευτική αγωγή για τη Φυματίωση που ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες. Η θεραπεία για την πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση μπορεί να διαρκέσει δεκαοκτώ μήνες ή και περισσότερο.