



Three purple capsules labeled 150mg and two orange capsules labeled 300mg.

Ίδιες με το Rifater

Email :

Το αρχικό σχέδιο ανάπτυξης έγινε από το Δίκτυο του οργανισμού TB Alert στο Βορειοδυτικό Λονδίνο.



Rifater, Εθαμβουτόλη,  
Πυραζιναμίδη και Rifinah

[illegible]

## Rifater



Το Rifater είναι συνδυασμός τριών φαρμάκων (Ριφαμπικίνης, Ισονιαζίδης και Πυραζιναμίδης) σε ένα χάπι.

### Πριν πάρετε το Rifater

Ενημερώστε τον ιατρό σας για:

- Όλα τα φάρμακα που παίρνετε συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αγοράζετε χωρίς ιατρική συνταγή από το φαρμακείο σας
- Προηγούμενη αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο φάρμακο
- Εάν υποφέρατε ποτέ από κάποια ασθένεια του ήπατος

### Λήψη του Rifater

Το Rifater απορροφάται καλύτερα όταν το στομάχι είναι άδειο. Παίρνετε το Rifater μισή ώρα πριν το φαγητό σας. Ο ιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας την πιο κατάλληλη ώρα για εσάς να πάρετε το Rifater.

### Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Το Rifater όπως και όλα τα φάρμακα, μπορεί να έχουν ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες:

- Στομαχικές διαταραχές όπως ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας), εμετό και διάρροια
- Συμπτώματα γρίπης όπως κρυάδες, πυρετό, ζάλη και πόνο στα οστά
- Ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος ή των οφθαλμών). Εάν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, παρακαλείσθε να διακόψετε όλα σας τα φάρμακα και να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια
- Δερματικά εξανθήματα και κνησμό
- Προβλήματα εμμήνου ρήσεως
- Περιφερική νευροπάθεια (τσιμπήματα στα δάχτυλα του χεριού ή του ποδιού)

- Οι σωματικές εκκρίσεις (ούρα, σίελος, σπέρμα, κολπικά υγρά) θα είναι χρώματος πορτοκαλί-κόκκινο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δε θα πρέπει να σας ανησυχήσει. Εάν όμως τα ούρα σας είναι σκουρόχρωμα πριν να λάβετε το Rifater ενημερώστε τον ιατρό σας. Οι φακοί επαφής μπορεί επίσης να αποχρωματιστούν.
- Η αποτελεσματικότητα των ορμονικών αντισυλληπτικών (δια του στόματος, εμφυτευμένα ή άλλα) μειώνεται. Θα χρειαστείτε εναλλακτικές ή επιπρόσθετες μεθόδους αντισύλληψης. Ζητήστε τη συμβουλή του ιατρού σας.

## Ethambutol



### Πριν πάρετε την Εθαμβουτόλη

Ενημερώστε τον ιατρό σας για:

- Όλα τα φάρμακα που παίρνετε συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αγοράζετε χωρίς ιατρική συνταγή από το φαρμακείο σας
- Προηγούμενη αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο φάρμακο

### Λήψη της Εθαμβουτόλης


Η Εθαμβουτόλη μπορεί να ληφθεί πριν ή μετά το γεύμα σας. Θα συζητήσετε με τον ιατρό σας την πιο κατάλληλη ώρα για εσάς να λαμβάνετε την Εθαμβουτόλη.

### Ανεπιθύμητες Ενέργειες:

Η Εθαμβουτόλη σπάνια μπορεί να προκαλέσει οφθαλμικές διαταραχές (θολή όραση και χρωματικές διαταραχές στο κόκκινο/πράσινο).

Ο ιατρός σας θα κανονίσει για εσάς μια απλή οφθαλμική εξέταση προτού να ξεκινήσετε τη λήψη Εθαμβουτόλης. Εάν αναπτύξετε τις παραπάνω οφθαλμικές διαταραχές καθώς παίρνετε Εθαμβουτόλη, παρακαλείσθε να το διακόψετε και να ενημερώστε αμέσως τον ιατρό σας.

## Pyrazinamide



### Πριν πάρετε Πυραζιναμίδα

Ενημερώστε τον ιατρό σας για:

- Όλα τα φάρμακα που παίρνετε συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αγοράζετε χωρίς ιατρική συνταγή από το φαρμακείο σας
- Προηγούμενη αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο φάρμακο
- Εάν υποφέρατε ποτέ από κάποια ασθένεια του ήπατος

### Λαμβάνοντας Πυραζιναμίδα

Η Πυραζιναμίδα μπορεί να ληφθεί πριν ή μετά το γεύμα σας. Θα συζητήσετε με τον ιατρό σας την πιο κατάλληλη ώρα για εσάς να λαμβάνετε την Πυραζιναμίδα.

### Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Η Πυραζιναμίδα όπως και όλα τα φάρμακα, μπορεί να έχουν ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες:

- Στομαχικές διαταραχές όπως ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας), εμετό και διάρροια
- Συμπτώματα γρίπης όπως κρυάδες, πυρετός, ζάλη και πόνος στα οστά
- Ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος ή των οφθαλμών). Εάν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, παρακαλείσθε να διακόψετε όλα σας τα φάρμακα και να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια
- Δερματικά εξανθήματα και κνησμό