

બીસીજીની રસી (બેસિલ કામેટ-ગ્યુરિન)

આ ટીબી સામે રક્ષણ આપવામાં સહાય કરે છે. આ ટીબીના જીવાણુઓની નબળી કરેલી હારમાળા હોય છે જે રોગકારક નથી હોતી. તે પ્રતિકારક શક્તિનું નિર્માણ કરીને શરીરને ટીબી સામે લડવા માટે તૈયાર કરે છે. બીસીજી ટીબી સામે રક્ષણ આપે છે, પરંતુ આ રસી આપી હોય તે દરેકનું તે રક્ષણ કરતી નથી.

૨૦૦૫ માં બીસીજીના કાર્યક્રમમાં થયેલા ફેરફાર બાદ, યુનાઈટેડ કિંગડમમાં સેકન્ડરી શાળાઓમાં બાળકોને પૂર્વક્રમ અનુસાર બીસીજી આપવામાં આવતી નથી. તેના સ્થાને ટ્ર્યુબરક્યુલોસિસ (ટીબી)નું વધુ જોખમ ધરાવતાં હોય તેવા શિશુઓ, બાળકો તથા કુમળાં વયસ્કો માટે લક્ષિત કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે.

બીસીજી લેવાની જરૂર કોને હોય છે ?

સ્વાસ્થ્ય વિભાગના સૂચન મુજબ:

- ૧૨ મહિનાથી નાનાં શિશુઓ, જન્મેલાં અથવા જ્યાં કેસની સંખ્યા વધુ (અર્થાત્ પ્રતિ ૧૦૦,૦૦૦ લોકોમાં વર્ષે ૪૦ થી વધુ કેસો) હોય તેવા વિસ્તારોમાં રહેતાં, અથવા જેમનાં માતાપિતા અથવા દાદા-દાદી ટીબીના કેસની ઊંચી સંખ્યા ધરાવતા હોય તેવા દેશમાં જન્મ્યા હોય. જો આપનું બાળક આ શ્રેણીમાં આવતું હોય તો આપની દાયણ અથવા સ્વાસ્થ્ય મુલાકાતીએ આપમેળે બીસીજીની સગવડ કરવી જોઈએ. આપને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપે તેમની સાથે વાત કરવી જોઈએ.
- બીસીજી ન આપી હોય તેવાં મોટી વયના બાળકોને ટીબીના ભયસ્થાન માટે તપાસવા જોઈએ અને યોગ્ય હોય તો તેમને રસી મૂકવી જોઈએ. કેસની ઊંચી સંખ્યા ધરાવતા દેશો અથવા આવા દેશમાં જન્મેલાં માતાપિતા અથવા દાદીને કારણે સામાન્ય રીતે ભયસ્થાનો ઊભાં થતાં હોય છે. જો આપને લાગતું હોય કે આપના બાળકને વધુ જોખમ છે અને તેમને રસી નથી મુકી, તો સ્થાનિક ઈમ્યુનાઈઝેશન કો-ઓર્ડિનેટરની સલાહ લેવા માટે કૃપા કરીને આપના સ્વાસ્થ્ય મુલાકાતી, વ્યાવસાયિક નર્સ અથવા જીપીનો સંપર્ક કરો.

અન્ય ચોક્કસ સમૂહો અથવા વ્યક્તિઓ પણ છે જેમને ટીબીનું જોખમ વધુ હોય છે.

- ફેફસામાં ટ્ર્યુબરક્યુલોસિસ હોય તેવા લોકો સાથે ગાઠ સંપર્ક. જો આપ આ શ્રેણીમાં આવતાં હો તો સ્થાનિક જન સ્વાસ્થ્ય સેવા આપની ઓળખ કરી લેશે અને આપનો સંપર્ક કરશે.
- વ્યાવસાયિક સમૂહો જેમ કે સ્વાસ્થ્યસંભાળમાં, વડીલો સાથે, બેઘરો તથા નિરાશ્રિતો માટેની હોસ્ટેલમાં કાર્ય કરનાર, લેબોરેટરી સ્ટાફ, જેલના કર્મચારી તથા પશુચિકિત્સાનો સ્ટાફ. જો આપ આમાંના કોઈ સમૂહમાં હો, આપની વય ૩૫ થી ઓછી હોય (રિસર્ચ જણાવે છે કે ૩૫ થી વધુ વયના લોકો પર બીસીજીની અસર ખૂબ ઓછી હોય છે) અને આપને પહેલાં રસી ન મૂકી હોય, તો આપે બીસીજી માટે આપના વ્યાવસાયિક સ્વાસ્થ્ય અથવા પર્સોનેલ ડિપાર્ટમેન્ટનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
- ૧૬ થી ઓછી વયની વ્યક્તિઓ કે જેઓ ટીબીના કેસની ઊંચી સંખ્યા ધરાવે છે તેવા દેશમાં સ્થાનિક લોકો સાથે ત્રણ મહિનાથી વધુ સમય માટે રહેવાના છે. જો આપ આ સમૂહમાં હો અને આપને પહેલાં રસી ન મૂકી હોય તો આપને બીસીજીની જરૂર પડી શકે છે, પરંતુ એનએચએસ પરથી આપને રસી ન મળે તેમ બની શકે. આપે વ્યક્તિગત રીતે બીસીજી મેળવવી પડે. વધુ વિવરણ માટે નીચે જુઓ.

પરંતુ મને બીસીજી જોઈએ છે, તો શું હું તે મેળવી શકું ?

જો આપ સૂચિત કરેલા સમૂહોમાં સામેલ ન હો તો આપને બીસીજીની સલાહ આપવામાં આવતી નથી, અને આપને તે એનએચએસમાંથી મળી નહીં શકે.

મુસાફરી માટે બીસીજી

નિયમિત મુસાફરી માટેની રસી તરીકે બીસીજીની સલાહ આપવામાં આવતી નથી.

૧૬ થી ઓછી વયની વ્યક્તિઓ કે જેઓ ટીબીના કેસની ઊંચી સંખ્યા ધરાવે છે તેવા દેશમાં સ્થાનિક લોકો સાથે ત્રણ મહિનાથી વધુ સમય માટે રહેવાના છે અને જેમણે બીસીજી ન લીધેલી હોય તેમને બીસીજીની જરૂર છે કે નહીં તે જાણવા માટે ત્વચા ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે, મુસાફરી માટે બીસીજી તથા તેનું પરીક્ષણ ગુપ્ત રીતે થવું જોઈએ. કેટલાંક ટ્રાવેલ ક્લિનિક્સ આ સેવા આપે છે પરંતુ કિંમતો જુદી જુદી હોય છે અને આગોતરો ફોન કરીને કિંમત જાણવી તે સલાહભર્યું છે. MASTA ટ્રાવેલ ક્લિનિક્સ યુકેમાં છે અને કેટલાંક, બધાં નહીં, બીસીજી આપે છે. તેમની વેબસાઈટ www.masta.org પરથી આપ આપની નજીકનું ક્લિનિક શોધી શકો છો.

જો આપ લંડનમાં રહેતાં હો, તો મોટા ભાગના મુખ્ય રેલ્વે સ્ટેશનો પરના મેડિસેન્ટર નામના ક્લિનિક્સ બીસીજી આપે છે. તેમની વેબસાઈટનું સરનામું છે www.medicentre.co.uk અથવા આપ 0870 600 0870 પર તેમને ફોન કરી શકો છો. જો આપને આ સેવા આપનાર ક્લિનિક શોધવામાં મુશ્કેલી થતી હોય તો આપ ટીબી એલર્ટને વધુ માહિતી માટે 0845 456 0995 પર ફોન કરી શકો છો.

ટીબી શું છે ?

ટીબી એ બેક્ટેરિયાથી લાગતો ચેપ છે જે સામાન્ય રીતે ફેફસાંને અસર કરે છે શરીરના કોઈ પણ ભાગને અસર કરી શકે છે. ટીબી સામાન્ય રીતે ૬ મહિના સુધી નિયમિત દવા લેવાથી મટી શકે છે. ફક્ત ફેફસાંનો અથવા ગળાનો ટીબી ચેપી હોઈ શકે છે અને મોટા ભાગના લોકો યોગ્ય દવા ચાલુ કર્યાના બે સપ્તાહ સુધી ચેપી હોતાં નથી.

તે કેવી રીતે પકડાય છે ?

જ્યારે ફેફસાંનો કે ગળાનો ટીબી ધરાવનાર વ્યક્તિ ખાંસી કે છાંંક ખાય છે ત્યારે જીવાણુઓ નાનાં છાંંટા રૂપે હવામાં ફેલાઈ શકે છે અને અન્ય લોકો તેમને શ્વાસમાં લે છે. ટીબીથી અસરગ્રસ્ત થનાર એ લોકો હોય છે જેઓ ટીબી ધરાવનાર વ્યક્તિ (સામાન્ય રીતે સાથીદાર અને એક જ ઘરમાં રહેતી અન્ય વ્યક્તિ, અથવા અસામાન્ય રૂપે નજીકના સહકાર્યકર) સાથે ખૂબ સમય ગાળતાં હોય છે. એ વાત ખૂબ અસ્વાભાવિક છે કે કોઈને બસ અથવા ટ્રેનમાં ટીબીનો ચેપ લાગે, કારણ કે ચેપ લાગવા માટે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ સાથે ગાળેલા કલાકોની સંખ્યા સામાન્ય રીતે મહત્વની હોય છે. થૂંકવાથી કે વસ્તુઓ વહેંચવાથી ટીબી ફેલાતો નથી.

યુકેમાં, ટીબી થવાનું જોખમ ધરાવતાં લોકો એ છે જેઓ:

- ચેપી કેસ સાથે લાંબા સમયથી સંપર્કમાં હોય;
- જ્યાં ટીબી હજુ સામાન્ય હોય તેવા સ્થળોમાં રહેતાં હોય;
- એચઆઈવી અથવા અન્ય તબીબી પરિસ્થિતિને કારણે નબળી પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતાં હોય
- બેઘરપણું, શરાબીપણું અથવા ડ્રગના દુરુપયોગ જેવા સામજિક કારણે ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા ધરાવતાં હોય

સામાન્ય જનતા કરતાં નાનાં બાળકો તથા ખૂબ મોટી વયના લોકોને ટીબી થવાનું જોખમ વધુ છે.

ચેપ તથા સક્રિય રોગ વચ્ચે બહુ મોટો તફાવત છે; લોકોને ચેપ લાગ્યો હોઈ શકે છે પરંતુ તેઓ માંદા ન હોઈ શકે (આ છુપો ટીબી કહેવાય છે), કારણ કે મોટા ભાગના લોકોની પ્રતિકારક શક્તિ બેક્ટેરિયાને સક્રિય થવાથી રોકે છે. સક્રિય ટીબી જ બીજા લોકોને ચેપ લગાડી શકવાની શક્યતા ધરાવે છે.

મારી વય નાની હતી ત્યારે મેં બીસીજીની રસી લીધી નહોતી - યુકેમાં ટીબી વધી રહ્યો હોવાથી શું હવે મારે તે લેવી જરૂરી છે ?

૨૦૦૫ પહેલાં જ્યારે બીસીજીના શાળાકીય કાર્યક્રમોનો અંત આવ્યો, ત્યારે આપણામાંના મોટાભાગના લોકોએ શાળા કાળ દરમિયાન ૧૩ વર્ષની આજુબાજુ બીસીજીની રસી લીધી હશે. જો આપે રસી લીધી ન હોય (આપણામાંના ૩૦% લોકોએ નથી લીધી), તો હવે તે લેવાથી કોઈ ફાયદો થશે નહીં. બીસીજીની અસર લગભગ ૧૫ વર્ષ સુધી થતી હોવાનું મનાય છે અને રિસર્ચ જણાવે છે કે જો તે બીજી વાર આપવામાં આવે તો તેની અસર ખૂબ ઓછી હોય છે અને ૩૫ થી વધુ વયની વ્યક્તિઓ પર ખૂબ ઓછી અસરકારક હોય છે. મોટાભાગના લોકો માટે ટીબી થવાનું જોખમ ખૂબ ઓછું છે અને ટીબી રોકવાનો સૌથી સારો ઉપાય છે કે જેમને ટીબી થયો છે તેમને મટાડવો અને તે રીતે તેને ફેલાતો અટકાવવો.

