Test nella clinica per la TB

È possibile discutere il test per l' HIV con il medico o infermiere/a responsabile per la cura della TB che siano opportunamente qualificati. Tutte le informazioni vengono trattate in maniera confidenziale. Se si fa il test in clinica, il risultato sarà registrato nel proprio fascicolo ospedaliero; questo significa che il risultato può essere letto da altri medici o infermieri in ospedale coinvolti nel trattamento, ma da nessun'altro.

Test nella clinica locale per trattamenti Genito-Urinari

(Per ulteriori informazioni contattare il proprio infermiere/a responsabile per la cura della TB)

- In alcune cliniche, si può semplicemente entrare e aspettare per una visita medica, in altre ci potrebbe essere bisogno di prenotare un appuntamento.
- Non c'è bisogno di una lettera da un altro medico.
- Queste cliniche hanno regole speciali di confidenzialità.
- Il proprio fascicolo non lascerà mai la clinica e può solo essere letto dallo staff che lavora qui.
- Il risultato non sarà rilasciato al proprio medico curante.
- Non si deve dare un nome vero, una vera data di nascita o il vero indirizzo, ma bisogna assicurarsi di ricordare le informazioni che si danno.
- Se si vuole fare il test in un'altra clinica, chiamare gratis la Linea Assistenza Nazionale per l'AIDS allo 0800 567 123.
- È anche possibile fare il test presso il proprio medico curante.
- Comunque il medico potrebbe dover dare le informazioni riguardanti l'esito positivo del test dell'HIV a compagnie di assicurazione sanitaria o di assicurazioni sulla vita se si dovesse chiedere un credito assicurativo. Se questo potrebbe essere un problema, sarebbe meglio fare il test in una clinica per patologie genito-urinarie.

Proteggi la tua famiglia e i tuoi amici dalla TB - prendi tutti I tuoi farmaci per la TB

Altre fonti di consigli sui test

National AIDS Helpline (NAH)
Linea di Assistenza Nazionale per l'AIDS (NAH)
0800 567 123

African AIDS Helpline
Linea Africana di Assistenza per l' AIDS
0800 0967 500 (website: www.africaninengland.org)

Terrence Higgins Trust Helpline
Linea di Assistenza Terrence Higgins Trust
0845 12 21 200 (website: www.tht.org.uk)

Positively Women Helpline
Linea di Assistenza Positively Women
020 7713 0222 (website: www.positivelywomen.org.uk)

Blackliners Helpline
Linea di Assistenza Blackliners
020 7738 5274

Mainliners Helpline
Linea di Assistenza Mainliners
020 7582 5434 (website: www.mainliners.org.uk)

TB Alert è un ente di beneficenza unico che sensibilizza il Regno Unito sulla TB e aiuta il Servizio Sanitario Nazionale distribuendo informazioni ai pazienti. Noi aiutiamo progetti nei Paesi in via di sviluppo assicurandoci che tutti i pazienti ricevano il trattamento opportuno. Con il vostro aiuto possiamo avere un impatto positivo su tutto il mondo nei confronti della TB e salvare molte più vite.

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Per altre informazioni o copie di questo opuscolo, contattare lo 01273 234 770 (solo orari d'ufficio).

Per fare una donazione o per fare volontariato e aiutare la TB Alert, contattare lo 01273 234 784 (solo orari d'ufficio).

O visitare il sito web www.tbalert.org

Le informazioni date in questo opuscolo riguardo la diagnosi e il trattamento della Tubercolosi Multiresistente ai farmaci hanno lo scopo di dare informazioni generali sull'argomento. Non sono da intendersi come sostituzione per la conoscenza, l'esperienza, l'abilità e il giudizio del proprio/a infermiere/a o medico curante o altri operatori sanitari, Nessuna delle informazioni contenute in questo opuscolo deve essere usata per diagnosi o trattamento. Domande e dubbi riguardo la diagnosi e il trattamento dovrebbero essere indirizzate ad opportuni operatori sanitari.

Attività di sviluppo originale da parte del North West London

Società a responsabilità limitata alla prestazione di una garanzia iscritta in Inghilterra n. 3606528 Registrata all'albo di beneficenza al n. 1071886 progetto: worksong, Londra 020 8352 8300

TB ALERT
Stop Tuberculosis Worldwide

Un Test Importante per Coloro Che Hanno la Tubercolosi (TB)

NHS

Che cosa hanno in comune l'HIV e l'AIDS con la TB?

Nel Regno Unito, non necessariamente tutte coloro che hanno la TB sono anche affetti da HIV.Tuttavia, l'HIV/AIDS e la TB camminano di pari passo in diversi Paesi. Il virus dell' HIV danneggia il sistema immunitario permettendo cosi' alla TB di attaccare molto più facilmente.

Alcuni individui prendono la TB durante la permanenza in altri Paesi in cui sia l'HIV sia la TB sono comuni. Per tale motivo queste due infezioni sono correlate – chiunque abbia una delle due, potrebbe essere stato esposto anche all'altra.

Che cos'è l'HIV/AIDS?

- La sigla HIV sta per Virus di Immuno-Deficienza Umana. AIDS è una sigla che significa Sindrome di Immuno-Deficienza Acquisita.
- HIV è un'infezione che danneggia le difese del corpo contro altre patologie, maggiormente le infezioni.
- Quando altre patologie sono presenti insieme all'HIV, la persona ha l'AIDS.

Quanto è comune l'HIV?

L' HIV è presente in tutto il modno. Ma ci sono alcune aree - come l'Africa sub-sahariana, il Sud-Est Asiatico e l'Europa dell'Est - in cui l'AIDS è più comune.

Nel Regno Unito, si pensa che più di 30.000 persone stanno vivendo con HIV e il numero continua a salire con più di 6500 che risultano positive per la prima volta ogni anno. Nel mondo, il modo più comune per trasmettere l'HIV è tramite rapporti sessuali tra uomini e donne, comunque il numero di nuovi casi tra gli uomini che hanno rapporti con altri uomini rimane alto.

Esiste una cura per l'HIV e per l'AIDS?

Gli effetti dell'HIV possono essere controllati e anche invertiti dai farmaci anti-HIV. Al momento non esiste una cura per l'HIV e per l'AIDS. Comunque, le ricerche mostrano che molte persone che prendono farmaci anti-HIV vivono più a lungo e si sentono meglio. Se si sa di essere positivo all'HIV, si possono fare dei passi per ridurre il rischio di trasmettere l'infezione ad altri.

Come si trasmette l'HIV?

- Avendo sesso vaginale o anale senza preservativo. Anche il sesso orale non protetto comporta anche qualche rischio.
- Da una madre al bambino durante la gravidanza, al parto o durante l'allattamento.
- Condividendo aghi, siringhe o altri strumenti per iniettare droga.
- Tramite trattamenti con sangue non testato o con prodotti provenienti da sangue non testato.

Il test dell'HIV

Che cosa comporta il test? Un piccolo campione di sangue verrà prelevato dal braccio del paziente, verrà mandato in laboratorio e verrà testato.

È possibile che altre analisi del sangue siano state fatte in clinica, ma noi possiamo soltanto fare un test per l'HIV in accordo con il paziente e con il suo permesso. Tutti i test per l'HIV sono gratis.

Quanto tempo è necessario prima di avere il risultato?

Generalmente ci vogliono 3 giorni lavorativi per ottenere il risultato. Indipendentemente dal risultato, esso verrà consegnato personalmente al paziente dall'operatore sanitario: il risultato non potrà essere dato tramite telefono e generalmente non vengono date copie cartacee del risultato ai pazienti.

Che cosa dice il risultato?

HIV Negativo
Questo significa che non si ha l'HIV almeno che non si sia stati esposti al virus nei 3 mesi prima del test. Se si è stati esposti al virus negli ultimi 3 mesi, il test potrebbe non riconoscere la sua presenza (il periodo 'finestra'). Sarebbe consigliabile fare un altro test 3 mesi dopo l'ultima volta che si è stati a rischio di esposizione.

HIV Positivo
Si è affetti dall'HIV. Questo risultato viene controllato con un secondo test dell'HIV (un errore è molto improbabile). Si avrà un incontro confidenziale con uno specialista di HIV/AIDS, per aiutare il paziente ad accettare la diagnosi e discutere ogni tipo di trattamento necessario.

Chi saprà il risultato?

Il risultato è strettamente confidenziale, e verrà reso noto solo al paziente e allo staff conivolto nella sua cura. Nessun altro verrà informato del risultato senza il permesso del paziente. Il risultato non viene rilasciato al partner del paziente o a nessun altro componente della famiglia o amici, nbe' al datore di lavoro, al padrone di casa, al Governo, al Ministero degli Interni o all'Ufficio Immigrazione.

Dove si può andare per fare il test dell'HIV o per discutere il test?

Il test può essere fatto in una clinica per la cura della TB ma ci sono anche altri posti dove si può fare il test o dove si possono discutere tutti i dubbi che si possono avere.