

Rifinah



Isoniazide e Pirazinamide) in una compressa.

Prima di prendere Rifater

Informare il medico su:

- ☉ Tutti i farmaci che si stanno prendendo compresi quelli senza ricetta
- ☉ Ogni tipo di allergia ad altri farmaci che si ha avuto in passato
- ☉ Se si hanno avuto problemi al fegato

Prendere Rifinah

La stessa procedura del Rifater

Controindicazioni

Gli stessi di Rifater

Proteggi la tua famiglia e i tuoi amici dalla TB— prendi tutti i tuoi farmaci

Ricorda l'infermiera/e esperta/o di TB è qui per aiutarti e consigliarti durante il trattamento. Per favore contattare l'infermiera/e esperta/o di TB se non ci si sente bene durante il trattamento o se c'è qualcosa su cui non si è sicuri riguardo i farmaci.

L'infermiere/a esperto/a in TB è:

Il Medico Ospedaliero è:

Numero di Contatto:

Email:

TB Alert è un ente di beneficenza unico che sensibilizza il Regno Unito sulla TB e aiuta il Servizio Sanitario Nazionale distribuendo informazioni ai pazienti. Noi aiutiamo progetti nei Paesi in via di sviluppo assicurandoci che tutti i pazienti ricevano il trattamento opportuno. Con il vostro aiuto possiamo avere un impatto positivo su tutto il mondo nei confronti della TB e salvare molte più vite.



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 23403

Per altre informazioni o copie di questo opuscolo, contattare lo 01273 234 770 (solo orari d'ufficio).

Per fare una donazione o per fare volontariato e aiutare la TB Alert, contattare lo 01273 234 784 (solo orari d'ufficio).

O visitare il sito web www.tbalert.org

Le informazioni date in questo opuscolo riguardo a test e diagnosi di Tubercolosi sono per informazioni generali sull'argomento. Non devono essere considerate come una sostituzione della conoscenza, l'abilità e il giudizio del vostro infermiere/a o medico o di altro personale medico. Domande e dubbi riguardanti la diagnosi e il trattamento dovrebbero essere indirizzati a personale medico qualificato.

Lavoro di sviluppo originale del North West London TB Network

Società a responsabilità limitata alla prestazione di una garanzia iscritta in Inghilterra n. 3605528 Registrata all'albo di beneficenza al n. 1071886 progetto: workson, Londra 020 8352 8300



Rifater, Etambutolo, Pirazinamide & Rifinah



Rifater



Rifater è una combinazione di tre farmaci (Rifampicina, Isoniazide e Pirazinamide) in una compressa.

Prima di prendere Rifater

Informare il medico su:

- ⊙ Tutti i farmaci che si stanno prendendo compresi quelli senza ricetta
- ⊙ Ogni tipo di allergia ad altri farmaci che si ha avuto in passato
- ⊙ Se si hanno avuto problemi al fegato

Prendere Rifater

Rifater viene assorbito meglio a stomaco vuoto. Prendere Rifater mezz'ora prima di mangiare.

Il medico o l'infermiere/a discuterà con il paziente l'orario più conveniente per prendere Rifater.

Controindicazioni

Rifater, come altri farmaci, può avere alcune controindicazioni:

- ⊙ Problemi di stomaco come nausea (malessere) Vomito e diarrea
- ⊙ Sintomi da influenza come brividi, febbre, vertigini e dolori alle ossa
- ⊙ Itterizia (giallore della pelle o degli occhi). Se si nota questo, interrompere tutti i farmaci e consultare il medico immediatamente
- ⊙ Eruzioni cutanee e prurito
- ⊙ Problemi mestruali.
- ⊙ Neuropatia periferica (formicolio alle dita delle mani e dei piedi)

- ⊙ I liquidi biologici (urina, saliva, sperma, secrezioni vaginali) saranno arancione/rosso. Questo è normale e non una causa di preoccupazione. Se l'urina è scura prima della dose di Rifater informare il medico e l'infermiere/a. Le lenti a contatto potrebbero anche essere scolorite.
- ⊙ L'efficacia di contraccettivi ormonali (orali, impianti o altri) è ridotta. Saranno necessari altri metodi di contraccezione; si possono chiedere consigli al medico o all'infermiere/a.

Ethambutol



Prima di prendere Etambutolo

Informare il medico su:

- ⊙ Tutti i farmaci che si stanno prendendo compresi quelli senza ricetta
- ⊙ Ogni tipo di allergia ad altri farmaci che si ha avuto in passato

Prendere Etambutolo

Etambutolo può essere preso prima o dopo aver mangiato. Il medico o l'infermiere/a discuterà con il paziente l'orario più conveniente per prendere Etambutolo.

Effetti collaterali:

Etambutolo può raramente provocare disturbi alla vista (immagini sfuocate e disturbi verdi/rossi). Il medico o l'infermiere/a organizzeranno degli esami alla vista prima di iniziare a prendere Etambutolo. Se insorgono i disturbi visivi descritti durante il trattamento con Etambutolo, interrompere il farmaco e informare il medico o l'infermiere immediatamente.

Pirazinamide



Prima di prendere Pirazinamide

Informare il medico su:

- ⊙ Tutti i farmaci che si stanno prendendo compresi quelli senza ricetta
- ⊙ Ogni tipo di allergia ad altri farmaci avuta in passato
- ⊙ Se si hanno avuto problemi al fegato

Prendere Pirazinamide

Pirazinamide può essere preso prima o dopo aver mangiato. Il Medico o l'infermiere/a discuterà con il paziente l'orario più comodo per prendere Pirazinamide.

Effetti collaterali

Pirazinamide, come altri farmaci, può avere alcune controindicazioni:

- ⊙ Problemi di stomaco come nausea (malessere) vomito e diarrea
- ⊙ Sintomi da influenza come brividi, febbre, vertigini e dolori alle ossa
- ⊙ Itterizia (giallore della pelle o degli occhi). Se si nota questo, interrompere tutti i farmaci e consultare il medico immediatamente
- ⊙ Eruzioni cutanee e prurito

Rifater è una combinazione di tre farmaci (Rifampicina,