



د شپې ډیری خولی



د کار اصلی انکشاف د لندن شمال غرب TB نیټ ورک په واسطه

یادابنت:

TB څښی ده؟

تبرکلوز (TB) یو باکتریایی ناروغتیا ده چه اکثره په سږو کی پیدا کیږی خو کولای شی چه د بدن په هرو برخو باندی لکه ماغزه، ترشح کونکی مرغړي، گوردو او هډوکو باندی تاثیر ولری.

څنگه په دی مبتلا کیږی؟

کله چه یو څوک چه د سیریز TB ناروغی لری توخیزی ، میکروبونه د کوچنیو ذراتو په بڼان هوا ته خپره کیږی او کولای شی چه نور کسان یی تنفس کړی. هغه کسان چه د TB ناروغ سره په یو کور یا آپارتمان کی ژوند کوی ډیر امکان لری چه TB واخلی.

آیا زه عفونت لرم؟

د TB ټول ناروغان عفونت نلری. تاسو هغه وخت عفونی یاست چه د سږو یا د ستونی TB ولری او د ټوخی سره د TB عفونت خپړ کړی (دا خبرن شوی حالت نومیری). که د بدن په نورو برخو کی، بغیر له سږو او ستونی، TB ولری تاسو دا ناروغی بل چا تا نه انتقالوی. د تاسو ډاکر/ نرس کولای شی چه تاسو ته ډیر ملومات درکړی.

(MDR TB) د مختلفو دواگانو په

مقابل کی مقاومت لرونکی تبرکلوز

څښی دی؟

د MDR TB هغه وخت رشد کوی چه د TB میکروب د هغو دوو دواوه په مقابل کی چه د ټولو نه ډیری قدرتمندی دی او معمولاً د TB د تداوی لپاره استعمال کیږی مقاومت حاصل کړی. دا په دی معنی چه دغه دواګانی نور بڼه تاثیر نلری ځکه چه دوی نوره نشی کولای چه د TB باکتریا مری کړی.

کله تاسو شکمن کیږی چه یو څوک

(MDR TB) لری؟

هغی نومونی چه TB میکروب لری د آزمایشت لپاره لابراتوار ته استول کیږی چه وکتل شی چه که دا میکروبونه د مختلفو دواو په واسطه مړه کیږی. که چیری مړه نشو، د دی امکان بنسټه چه ناروغ د TB معمولی دواو په واسطه بڼه نشی، او یا کیدای شی چه د MDR TB ولری.

ولی خلک په MDR TB مبتلا

کیږی؟

1. که چیری په کوم علت تداوی په کافی توګه بڼه اجراء نشی TB کولای شی چه د تداوی په جریان کی مقاومت پیدا کړی، د مثال په توګه:

- ⊙ که چیری ناروغ خپله دوا په منظمه توګه، په هغه بڼان چه توصیه شویږی، او یا د یوی دوری دوا مکمله و نخوری.
- ⊙ که چیری مریض نشی کولای خپله دوا په کامله توګه جذب کړی، د مثال په توګه: د قی کولو په سبب.
- ⊙ که دوا په درسته توګه توصیه او تجویز نوی شوی.
- ⊙ که چیری د دوا کیفیت بڼه نوی.

2. کیدای شی چه ستاسو TB د شروع څخه مقاومت وی، ځکه چه د هغه چا څخه چه تاسو دا عفونت اخستی دی، هغه کس د دواو په مقابل کی مقاومت لرونکی TB لرله.

MDR TB د معمولی TB نه ډیره عفونی ندی خو هغه دوا چه د دی په مقابل کی استعمال کیږی لږ تاثیر لری او باید د ډیر مدت لپاره وخورل شی. د دی په خاطر د MDR TB مریض، په نسبت د TB مریض څخه چه د معمولی دواو په مقابل کی حساس دی، تر ډیره مدته پوری عفونی دی. (د دواو په مقابل حساس TB).

ولی د MDR TB تداوی مشکل دی؟

(MDR TB) د (دواو په مقابل کی حساس TB) نه ډیر عفونی ندی ولی د هغه تداوی ډیره مشکل دی.

هغه دوا چه د (دواو په مقابل کی مقاومت لرونکی TB) لپاره استعمال کیږی ډیر جانبی اثرات لری او د (دواو په مقابل کی حساس TB) په نسبت داروګانو څخه لږ تاثیر لری. دا په دی معنی دی چه د MDR TB مریضان د ډیر مدت لپاره تداوی ته احتیاج لری او کیدای شی چه ډیر ناروغه پاتی شی. د دی امکان هم بنسټه چه دوی د تداوی لپاره شفاخانه ته واستول شی.

تر کوم وخت پوری امکان لری چه

زه عفونی پاتی شم؟

دا د تاسو عکس العمل د هغه دواو په مقابل کی چه د تداوی لپاره یی مصرف کوی ارتباط لری. د MDR TB هر یو مورد مختلف دی.

د دی په خاطر چه TB د معمولی دواو په مقابل مقاومت لری کیدای شی چه تاسو د څو هفتو یا حتی میشتو لپاره عفونی پاتی شی.

تر څو مدت پوری به زه د تداوی

لاندی وم؟

د (دواو په مقابل کی حساس TB) د یو دوری دوا لږ تر لږه تر ښیږو میاشتو پوری دوام کوی. د MDR TB تداوی ممکنه دی چه تر اتلسو میاشتو یا ډیرو پوری ورسیري.