



Rifater, Ethambutol, Pyrazinamide & Rifinah



خپله کورنۍ او دوستان د سيل د مريضې څخه وساتې - خپله دوا پوره وځوري.

په یاد ولری چه د TB نرس د تداوی په جریان کی د تاسو د مرسته او راهنمایی د پاره همدلته دی. که تاسو د تداوی په وخت کی د ناروغتیا احساس کوی او یا د خپلی دوا څخه داده نیاست لطفاً د TB نرس سره په تماس کی شی.

ستاسود TB نرس:

ستاسو د شفاخاني ډاکټر:

د تماس نیولو شمار ه:

ایمیل:

TB Alert یوزانی خبریہ مؤسسہ دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز مرضی په باره کی آگاهی ورکوی، او نارغانو ته د معلوماتو په ورکولو سره د NHS په کارونو کی مرسته کوی. موږ د هغو پروژو څخه چه په پرمختلونکو هیوادو کی د مریضاتو د مناسبی تدایو ډاډ گیرنه ورکوی طرفداری کوی. د تاسو د مرستو په واسطه موږ کولی شو چه په جهانی توگه یو مثبت تاثیر د تبرکلوز په مریضی ولرو او د بیرو خلکو ژوند ته نجات ورکړو.



TB Alert,
Community Base
113 Queens Road,
Brighton, BN1 3XG
تلفون: 01273 234030

د زیاتو معلوماتو یا د دی ورقي د کاپیانو په لاس راوړو لپاره لطفاً په د
01273 234 770 شماری تماس ونیسی (صرف د رسمیاتو په وخت کی).

د اعانی ورکولو او یا د داوطلب په توګه په **TB Alert** کې د کار کولو لپاره په د
01273 234 784 (شماره تماس ونیسی) (صرف د رسمیاتو په وخت کې).

یازمون پر یہ ویب سائٹ www.tbalert.org کی تماس ونیسی۔

هغه معلومات چه په دې ورځه کې د مختلفو ډاګانو په مقابل کې مقاومت لرونکي-TB په هکله وړکول شويږي اړه اړه چې د دغو موضوع په باره کې عمومي اګاهي ورکړي. مقصد دا دی چې دغه معلوماتو هڅه ستاسو ډاکټر/نرس او دغو متخصصین د دې په ځنل کې لاندې، مهارت یا اقتدارت کې استفاده وکړي. هېڅ یو د دغو معلوماتو چه په دغه ورځه کې درج شويږي په تصمیم نیولو یا د مریضې د شناخت او یا د تداری لپاره باید استفاده ونشي. سوال او دپښینه د دې مریضې په شناخت او تداری په هکله باید مربوطه متخصصین ته وسپارل شي.

د کار اصلی انکشاف د لندن شمال غرب TB نیټ ورک په واسطه

Rifinah



د Rifinah ټابلېټ د دوو داروگانو (Rifampicin او Isoniazid) د ترکیب څخه جوړېږي.

د Rifinah د ټاډلېت د خوړو نه مخکې

خیل ڊاڪٽر ته ڀه ڊي ٻاره ڪي وواڀاست:

- 🟡 ټولې هغه دواوې چې تاسو یې خوړو، په شمول د هغه دواگانو
- 🟡 چې بدون د نسخې مو د دواخانې څخه اخستی دی
- 🟡 هر حساسیت چې د هری دوا په مقابل کې مو در لود
- 🟡 که چیرې به کم وخت کې مو د ښه مریضۍ لرله

Rifinah د تابلېت خوړل

د Rifater د خورلو په بنان دی

جانبی اثرات

د Rifater په بنیان دی

Pyrazinamide



د Pyrazinamide د ټابلېټ د خوړو نه مخکې

خپل ډاکټر ته په دی باره کی وواياست:

- ټولی هغه دواوی چه تاسو یی خوړوی، په شمول د هغه دواگانو چه بدون د نسخی مو د دواخانې څخه اخستی دی
- هر حساسیت چه د هری دوا په مقابل کی مو در لود
- که چیری په کوم وخت کی مو د ینه مریضی لرله

د Pyrazinamide د ټابلېټ خوړل

تاسو کولای شی چه د Pyrazinamide ټابلېټ مخکې او یا وروسته د ډوډی نه وخوړی. ستاسو ډاکټر یا نرس به تاسو ته د Ethambutol ټابلېټ د خوړو مناسب وخت وښایی.

جانبی اثرات

- د نورو دواگانو په ښان د Ethambutol ټابلېټ هم امکان لری چه یو څه جانبی تاثیرات ولری:
- د نس گډوډول لکه د زړه بدیدنه (د قی کولو احساس) قی کول اواسهال
- دانفلوانزا نښی لکه ساره، تبه، سرگنگسی او د هډوکو خوړیدل
- د زیری ناروغی (د پوستکی یا د سترگو زیر کیدل)، که چیری مو دا نښی ولیدی، لطفاً د دوا خوړل پریزیدی او پر تر ږره د تداوی کوښښ وکړی.
- د پوستکی دانی او خارښت

د بدن افرازات (متیازی، د خولی اویه، منی، د رحیم سیاله ماده) معمولاً به زیر او سور وی. دا عادی خبره ده او د اندیښنی وړ نه دی، که چیری د Rifater د ټابلېټ د خوړو نه مخکې ستاسو متیازی زیری وی خپل ډاکټر ته وواياست. د کانتک لینزونه به هم خپل رنگ له لاسه ورکړی.

د هورمونو(جنسی، تکثر او نوری هورمونی) د مخ نیوی داروگانو تاثیر کمیری. امکان لری چه تاسو ته د امیندواری د مخ نوی اضافی دارو درکرای شی یا د نورو طریقو استعمال ته ضرورت شی. د خپل ډاکټر یا نرس څخه راهنمایی وغوړی.

Ethambutol



د Ethambutol د ټابلېټ د خوړو نه مخکې

خپل ډاکټر ته په دی باره کی وواياست:

- ټولی هغه دواوی چه تاسو یی خوړوی، په شمول د هغه دواگانو چه بدون د نسخی مو د دواخانې څخه اخستی دی
- هر حساسیت چه د هری دوا په مقابل کی مو در لود

د Ethambutol د ټابلېټ خوړل

تاسو کولای شی چه د Ethambutol ټابلېټ مخکې او یا وروسته د ډوډی نه وخوړی. ستاسو ډاکټر یا نرس به تاسو ته د Ethambutol ټابلېټ د خوړو مناسب وخت وښایی.

جانبی اثرات

د Ethambutol ټابلېټ په کمه اندازه امکان لری چه د لیدلو مزاهمت وکړی (خیرن لیدل او د سورو/شنو د رنگونو د لیدلومزاهمت). پخواه له دی څخه چه د Ethambutol ټابلېټ خوړل شروع کړی ستاسو ډاکټر یا نرس به تاسو ته د سترگو یوه ساده معینه ترتیب کړی. که چیری تاسو ته د Ethambutol ټابلېټ د خوړو په جریان کی نوموړی مشکلات پینښ شو، لطفاً د ټابلېټ خوړل بند کړی او پر تر ږره خپل ډاکټر یا نرس ته خبر ورکړی.

Rifater



د Rifater ټابلېټ د درو داروگانو (Rifampicin, Isoniazid) او Pyrazinamide) د ترکیب څخه جوړیږی.

د Rifater د ټابلېټ د خوړو نه مخکې

خپل ډاکټر ته په دی باره کی وواياست:

- ټولی هغه دواوی چه تاسو یی خوړوی، په شمول د هغه دواگانو چه بدون د نسخی مو د دوا خانې څخه اخستی دی.
- هر حساسیت چه د هری دوا په مقابل کی مو در لود.
- که چیری په کوم وخت کی مو د ینه مریضی لرله.

د Rifater د ټابلېټ خوړل

په وری نس د Rifater ټابلېټ په ډیر ښه ډول جذب کیږی. د Rifater ټابلېټ د ډوډی نه نیم ساعت مخکې وخوړی. ستاسو ډاکټر یا نرس به تاسو ته توضیع درکړی چه د ورځی په کوم وخت باندی خپل د Rifater ټابلېټ وخوړی.

جانبی اثرات

- د نورو دواگانو په ښان د Rifater ټابلېټ هم امکان لری چه یو څه جانبی اثرات ولری:
- د نس گډوډول لکه د زړه بدیدنه (د قی کولو احساس) قی کول اواسهال
- دانفلوانزا نښی لکه ساره، تبه، سرگنگسی او د هډوکو خوړیدل
- د زیری ناروغی (د پوستکی یا د سترگو زیر کیدل)، که چیری مو دا نښی ولیدی، لطفاً د دوا خوړل پریزیدی او پر تر ږره د تداوی کوښښ وکړی
- د ښځو د میابنتنی مریضی مزاهمت
- د پوستکی دانی او خارښت
- د لاس او د پښو گوتی میږی کیدل او سنتی کیدل