Teste na clinica TB

Você pode informar-se sobre o teste VIH com o seu médico ou enfermeiro com formação especifica sobre o VIH e TB. Todas as informações são confidenciais. Se você fizer um teste na clinica de TB, o resultado será guardado nos registos do hospital; o que significa que os unicamente os profissionais de saúde terão acesso aos resultados no caso de tratamento.

Teste na Clínica de inecoogista (CG) Clinica

(Para mais informações contacte o seu enfermeiro de TB)

- Em algumas clinicas é possível ter consulta sem fazer apontamento previo, noutras terá de fazer o apontamento.
- Não é necessária recomendação de outro médico.
- Estas clinicas têm regras de confidencialidade rigorosas.
- Os resultados nunca saem da clinica e apenas podem ser lidas pelos profissionais de saúde ao serviço desta.
- O resultado não é divulgado ao seu CG.
- Você não é obrigado a usar o seu verdadeiro nome, data de nascimento ou residência, mas deve sempre lembrar a informação que tenha utilizado.
- Se você quiser fazer o teste noutra clinica, telefone à a linha de apoio nacional gratuíta para o SIDA para 0800 567 123.
- Você também pode fazer o teste com o seu médico.
- Se você corre o risco de que o seu médico possa passar a informação sobre o seu status VIH positivo para a companhia de seguros, você pode fazer o teste anônimo numa clínica GUM.

Mbroni familjen dhe miqtë tuaj nga tuberkulozi — merrni të gjithë mjekimin tuaj për tuberkulozin

Outras fontes de aconselhamento sobre testes

National AIDS Helpline (NAH) (Linha de Apoio à SIDA (NAH)) 0800 567123

African AIDS Helpline (Linha de Apoios Africana à SIDA) 0800 0967 500 (website: www.africaninengland.org)

Terrence Higgins Trust Helpline (Linha de Apoio Terrence Higgins Trust) 0845 12 21 200 (website: www.tht.org.uk)

Positively Women Helpline (Linha de Apoio de MulheressPositivas)

020 7713 0222 (website: www.positivelywomen.org.uk)

Blackliners Helpline (Linha de Apoio Blackliners) 020 7738 5274

Mainliners Helpline (Linha de Apoio Mainliners) 020 7582 5434 (website: www.mainliners.org.uk)

TB Alert é uma forma de conscientização e de caridade da Tuberculose no RU e de apoio ao trabalho do SNS (NHS) dando informações aos pacientes. Apoiamos projectos em países em desenvolvimento assegurando que todos os doentes recebem o tratamento adequado com o seu apoio podemos ter um impacto positivo a nível mundial no tratamento da Tuberculose e salvar mais vidas.



TB Alert, Community Base, 113 Queens Road, Brighton BN1 3XG Tel: 01273 234030

Para mais informações ou cópias deste desdobrável contacte 01273 234 770 (horário expediente).

Para donativos ou voluntariado para o **TB Alert** contacte 01273 234 784 (horário expediente).

Ou visite o nosso site www.tbalert.org

A informação dada neste desdobrável relativo ao ao teste do VIH não substitui os conhecimentos, perícia e avaliação de um enfermeiro/médico ou outro profissional de saúde. A informação dada neste folhetol não substitui o diagnostico e tratamento. Estas avaliações devem sempre ser efectuadas por um profissional de saúde.

Desenvolvimento trabalho original pelo North West London TB Networ



VIH, Um Teste Importante para Pessoas Com Tuberculose (TB)

Febre!!

Proposition of the prop



Qual a relação entre o VIH, a SIDA e a TB?

A maioria das pessoas com TB no Reino Unido não necessariamente estão infectadas com VIH. No entanto, o VIH/SIDA e a TB andam de mãos dadas frequentemente em alguns países. O VIH enfraquece o sistema imunológico da pessoas, o que permite que a bacteria da TB ataque o corpo mais facilmente.

Algumas pessoas contagiam-se com TB em países onde o VIH e a TB são comuns. Por isso estas duas infecções estão intrisicamente ligadas — quem tiver uma pode ter estado vulnerável à outra.

O que é o VIH/SIDA?

- VIH é Vírus de Imunodeficiencia Humana. SIDA significa Sindroma da Imunodeficiência Adquirida.
- VIH é uma infecção que danifica as defesas do corpo contra outras doenças, principalmente infecções.
- Quando determinadas doenças ocorrem com a infecção do VIH a pessoa tem SIDA.

Qual a regularidade do VIH?

O VIH é encontrado em todo o mundo. Mas existem zonas como a África Subsaharianal, em partes da Ásia e Europa de Leste - em que o VIH é mais frequente.

No Reino Unido, estima-se que existam 30.000 pessoas com VIH, e o número continua a crescer, sendo que cada ano 6500 pessoas tem resultado positivo por primeira vez. O modo mais predominante de transmissão do VIH ao redor do mundo é através relações heterossexuais, no entanto o número de novas infecções entre homossexuais mantém-se elevado.

Existe cura para o VIH e SIDA?

Os efeitos do VIH podem ser controlados com medicamentos anti-retrovirais.. Actualmente não existe cura para o VIH ou SIDA. No entanto, estudos indicam que a maioria das pessoas que toma medicamentos anti-retrovirais vivem mais tempo e com melhor qualidade de vida. Sabe-se que as pessoas vivendo com o VIH podem tomar medidas para reduzir o risco de infecção a terceiros.

Como se contagia o VIH?

- Através de relações sexuais na vagina ou anûs desprotegidas (sem preservativo). O sexo oral sem protecção também corre riscos.
- De mãe para filho durante a gravidez, durante o parto ou através da amamentação.
- Partilhando agulhas, seringas ou outros equipamentos para o uso de drogas injectáveis.
- Através da transmissão de sangue contaminado ou tratamento com sangue contaminado.

Teste VIH

O que requer o teste?

Uma pequena amostra de sangue será colectada e encaminhada a um p laboratório para ser testada. Mesmo que você já tenha efectuado teste sanguineos na clinica, o teste de VIH só poderá ser feito com o seu consentimento. Todos os testes do VIH são gratuítos.

Quanto tempo demora o resultado?

Normalmente três dias úteis. Qualquer que seja o resultado, o resultado ser-lhe-á entregue em mãos por um profissional de saúde. O resultado não deve ser dado por telefone e as cópias do resultado não são, normalmente, entregues aos doentes.

O que me diz o resultado?

VIH Negativo

Significa você que não está infectado com o VIH. No entanto, se você tiver sido exposto nos últimos três meses o teste não pode detectar o virus (o período de 'janela'). Aconselha-se a fazer um novo teste 3 meses após a última vez que correu o risco de se contagiar com o VIH.

VIH Positivo

Você Tem VIH. O resultado é verificado com um segundo teste VIH (embora um erro seja improvável) Você terá uma consulta confidencial com um especialista em VIH/SIDA, quem o apoiará para lidar com o diagnóstico e proceder com o tratamento necessário.

Quem tem acesso aos resultados?

O resultado é estritamente confidencial, para si e para os profissionais de saúde. Mas ninguém terá acesso aos resultados sem o seu consentimento. O resultado não é divulgado ao seu/sua parceiro(parceira), familia ou amigos, empregador, senhorio, Governo, Segurança Social ou Serviço de Immigração.

Onde devo dirigir para fazer um teste de VIH ou falar sobre o teste?

Você pode fazer o teste na clinica TB mas existem outros locais onde pode fazer o teste ou falar sobre as suas preocupações.

POR_52923 Important test TB.indd 2 30/09/2009 11:56