

Notas:

Email:



TB
ALERT
Stop Tuberculosis Worldwide

Trabalho original desenvolvido pelo North West London TB Network



Tuberculose Multi-Resistente (MDR TB)



O que é a TB?

Tuberculose (TB) é uma infecção bacteriológica normalmente pulmonar mas que pode afectar qualquer parte do corpo como o cérebro, glândulas linfáticas, rins e ossos.

Como se contagia?

Quando alguém com TB infecciosa dos pulmões tosse, os germes entram no ar em pequenas partículas que podem ser inaladas. As pessoas com maior probabilidade de contrair a doença são os que coabitam com a pessoa com TB.

Sou contagioso?

Nem todas as pessoas com TB são contagiosas. É contagiosa se tiver TB pulmonar ou na garganta e se tossir germes da TB (chama-se contágio positivo). Não é contagioso a outros se tiver TB noutra local do corpo exceptuando pulmões e garganta. O seu médico ou enfermeiro podem fornecer mais informações.

O que é a TB Multir resistente Tuberculose (MDR)?

A TB MDR desenvolve-se quando os germes se tornam resistentes aos fármacos mais potentes no tratamento da TB. Significa que estes medicamentos não resultam eficazmente dado já não atacarem a bactéria da TB.

Quando suspeitar de TB MDR?

As amostras que contém germes de Tb multi-resistente podem ser testados em laboratório para verificar a sua resistência a diferentes medicamentos. Se não for, é provável que o doente não melhore com os medicamentos normais da TB o que sugere TB MDR.

Como é que se tem a TB MDR?

1. A TB pode tornar-se resistente durante o tratamento se o tratamento efectuado tiver sido desajustado, por exemplo:
 - Se o paciente não tomar os medicamentos regularmente conforme receitado ou não faz o tratamento completo
 - Se o paciente não fizer absorção completa dos medicamentos, por exemplo, devido a vómitos
 - Se os medicamentos não tiverem sido correctamente receitados ou administrados
 - Se os medicamentos forem de baixa qualidade
2. A TB pode ser resistente à partida porque a pessoa contagiada pode já ter TB multirresistente.

A TB MDR não é mais contagiosa que a TB normal, os medicamentos utilizados são menos eficientes e têm de ser tomados por maiores períodos de tempo. Uma pessoa com TB MDR é, consequentemente, mais contagiosa que uma pessoa com TB sensível a medicamentos normais (TB sensível medicação).

Porque é um problema MDR?

A TB MDR não é mais contagiosa que a com sensibilidade aos medicamentos é mais difícil de tratar.

Os medicamentos usados no tratamento da TB multirresistente têm mais efeitos secundários e são menos eficientes que os medicamentos da TB sensível. Significa que os pacientes com TB MDR necessitam de tratamento por maiores e mais graves períodos de tempo. Também existe maior probabilidade de darem entrada num hospital para tratamento.

Durante quanto tempo é contagiosa?

Depende da reacção aos medicamentos, cada caso de TB MDR é um caso.

Porque a TB é resistente aos medicamentos normais, pode estar-se infectado durante semanas ou meses.

Quanto tempo preciso de fazer o tratamento?

O percurso de uma TB sensível dura pelo menos seis meses. A TB MDR pode dura dezoito meses ou mais.