

Rifater



Rifater é a combinação de três medicamentos (Rifampicine, Isoniazide e Pyrazinamide) numa toma.

Antes de tomar Rifater

Informe o seu médico de:

- Todos os outros medicamentos que está a tomar mesmo aqueles que adquiriu sem receita médica em farmácias
- De alergias a outros medicamentos
- Se sofre de alguma doença hepática

Toma do Rifater

O Rifater é melhor absorvido com o estômago vazio. Tome o Rifater meia hora antes de comer.

O seu médico ou enfermeiro informarão da melhor hora da toma do Rifater.

Efeitos secundários

O Rifater, tal como a maioria dos medicamentos, pode ter efeitos secundários:

- Distúrbios gástricos como náuseas (indisposição) vômitos e diarreia
- Sintomas gripais como arrepios, febre, tonturas e dores ósseas
- Sintomas gripais como arrepios, febre, tonturas e dores ósseas medicamentos e procure ajuda médica imediatamente
- Irritações cutâneas e comichão
- Distúrbios menstruais
- Neuropatia periférica (alfinetes e agulhas nos dedos)

- Secreções (urina, saliva, sémen, fluidos vaginais) serão alaranjados. É normal sem motivo para alarme; se a urina for escura antes da sua dose de Rifater informe o seu médico ou enfermeiro. As lentes de contacto também podem descolorar
- A eficácia dos contraceptivos hormonais (orais, implantes ou outros) é reduzida. Necessitará de métodos alternativos ou adicionais de contraceção; peça aconselhamento ao seu médico

Ethambutol



Antes de tomar Ethambutol

Informe o seu médico de:

- Todos os outros medicamentos que está a tomar mesmo aqueles que adquiriu sem receita médica em farmácias
 - De alergias a outros medicamentos
- Se sofre de alguma doença hepática

Toma do Ethambutol

O Ethambutol pode ser tomado antes ou depois da refeição. O seu médico ou enfermeiro informarão da melhor hora da toma do Ethambutol.

Efeitos secundários:

O Ethambutol causa, muito raramente, distúrbios visuais (distúrbios de visão a verde/vermelho).

O seu médico ou enfermeiro providenciarão um teste à vista antes de iniciar o Ethambutol. Se tiver os distúrbios descritos ao tomar Ethambutol, pare de tomar o medicamento e informe o seu médico de imediato.

Pyrazinamide



Antes de tomar Pyrazinamide

Informe o seu médico de:

- Todos os outros medicamentos que está a tomar mesmo aqueles que adquiriu sem receita médica em farmácias
- De alergias a outros medicamentos
- Se sofre de alguma doença hepática

Toma do Pyrazinamide

O Pyrazinamide pode ser tomado antes ou depois da refeições. O seu médico ou enfermeiro informarão da melhor hora da toma do Pyrazinamide.

Efeitos secundários

O Pyrazinamide, tal como a maioria dos medicamentos, pode ter efeitos secundários:

- Distúrbios gástricos como náuseas (indisposição) vômitos e diarreia
- Sintomas gripais como arrepios, febre, tonturas e dores ósseas
- Icterícia (amarelamento da pele e olhos) Se notado, pare de tomar todos os medicamentos e procure ajuda médica imediatamente
- Irritações cutâneas e comichão