

Zanim zastosujesz Rifinah

- Wszystkich innych lekarstwach, jakie bierzesz, w tym o lekach bez recepty
- O wszelkich objawach alergii na leki w przeszłości
- Czy kiedykolwiek chorowałeś na wątrobę

Stosowanie leku Rifinah

Działania niepożądane

Takie same jak Rifater

Pamiętaj! pielęgniarka poradni przeciwgruźliczej chce ci pomóc i służyć radą w trakcie całego cyklu leczenia. Jeśli kuracja spowoduje złe samopoczucie lub będziesz miał jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące przyjmowanych leków, skontaktuj się z twoją pielęgniarką w przychodni przeciwgruźliczej.

Twój lekarz w szpitalu:

Nr telefonu:

E mail:

TB Alert jest organizacją charytatywną, która stawia sobie za cel rozwijanie świadomości o zagrożeniu gruźlicą w Zjednoczonym Królestwie i wspieranie publicznej służby zdrowia szeroką informacją dla pacjentów. Wspieramy projekty w krajach rozwijających się skierowane na prawidłowe leczenie wszystkich dotkniętych tą chorobą. Twoje wsparcie pomoże nam osiągnąć lepszy skutek w walce z gruźlicą i umożliwi uratowanie więcej istnień ludzkich.



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Aby uzyskać więcej informacji lub dodatkowe egzemplarze ulotki prosimy o kontakt: 01273 234 770 (w godzinach urzędowania)

Darowizny lub pomoc wolontariuszy **TB Alert**, prosimy o kontakt
01273 234 784 (w godzinach urzędowania)

Zapraszamy na stronę www.tbalert.org

Celem informacji podanych w niniejszej ulotce, dotyczących leczenia gruźlicy, nie jest zastąpienie wiedzy, kompetencji, umiejętności i opinii pielęgniarki/lekarza poradni przeciwgruźliczej lub innych pracowników służby zdrowia. Żadne informacje w niej podane nie są przeznaczone do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. Pytania i wątpliwości dotyczące twojego leczenia należy kierować do pracownika służby zdrowia.

Oryginalne opracowanie North West London TB Network



Rifater, Ethambutol, Pyrazinamide i Rifinah

el lub
iększone kas
ączka!! Silne
lek mas
w Gorączka!! Silne
ne pocenie
szłem lub
iększon
tem lub b
Z kaszlem lub bez kaszlu
ączka!! ączka!! Gorączka!! Powiększone
adek wagi ciała Gorączka!! Spadek wagi ciała Gorączka!!
ączka!! Silne pocenie
Silne pocenie się w nocy Kaszel lub brak kaszlu Gorączka!!
kaszłem lub bez kaszlu Powiększone kaszłem lub bez kaszlu
Gorączka!! Spadek masy ciała Gorączka!!
Silne pocenie się w nocy Kaszel lub brak kaszlu Gorączka!!
kaszłem lub bez kaszlu Powiększone kaszłem lub bez kaszlu
Gorączka!! Gorączka!! Gorączka!! Silne pocenie się
Z kaszlem lub bez kaszlu
Silne pocenie się w nocy Kaszel lub brak kaszlu Gorączka!!

Rifater



Rifater jest kombinacją trzech leków (Rifampicin, Isoniazid i Pyrazinamide) w jednej tabletce.

Zanim zastosujesz Rifater

Poinformuj swojego lekarza o:

- Wszystkich innych leków, jakie bierzesz, w tym o lekach bez recepty
- O wszelkich objawach alergii na leki w przeszłości
- Czy kiedykolwiek chorowałeś na wątrobę

Stosowanie leku Rifater

Rifater najlepiej wchłania się na czczo. Zażywaj Rifater pół godziny przed jedzeniem.

Lekarz lub pielęgniarka omówi z tobą, jaka jest najlepsza pora brania tego leku.

Działania niepożądane

Rifater, podobnie jak inne leki, może wywołać działania niepożądane:

- Zaburzenia żołądkowe, jak np. mdłości, wymioty lub rozwolnienie
- Objawy jak przy grypie, czyli dreszcze, gorączka, zawroty głowy lub bóle kostne
- Żółtaczka (żółknienie skóry lub oczu) Jeśli zauważysz te objawy, wstrzymaj się z przyjmowaniem wszelkich leków i natychmiast skonsultuj się z lekarzem
- Wysypka lub swędzenie
- Zaburzenia cyklu menstrualnego
- Neuropatia obwodowa (mrowienie palców rąk lub stóp)

- Wydaliny (mocz, ślina, sperma, płyny pochwowe) będą zabarwione na pomarańczowo-czerwono. Jest to normalne i nie jest powodem do niepokoju. Jeśli twój mocz jest ciemny przed przyjęciem leku Rifater, poinformuj o tym lekarza lub pielęgniarkę. Szklka kontaktowa mogą również ulec przebarwieniu.
- Skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych (doustnych, implantów i in.) jest zmniejszona; skonsultuj się z pielęgniarką lub lekarzem.

Ethambutol



Zanim zastosujesz Ethambutol

Poinformuj swojego lekarza o:

- Wszystkich innych lekach, jakie bierzesz, w tym o lekach bez recepty
- O wszelkich objawach alergii na leki w przeszłości

Stosowanie leku Ethambutol

Ethambutol można brać przed lub po jedzeniu. Lekarz lub pielęgniarka omówi z tobą, jaka jest najlepsza pora brania tego leku.

Działania niepożądane:

Ethambutol w rzadkich przypadkach może wywołać zaburzenia wzrokowe (niewyraźne widzenie i zaburzenia w widzeniu koloru czerwonego i zielonego). Lekarz lub pielęgniarka zleca przeprowadzenie prostego badania wzroku przed podjęciem kuracji lekiem Ethambutol. W razie powyższych objawów wzrokowych podczas przyjmowania Ethambutolu, należy go odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Pyrazinamide



Zanim zastosujesz Pyrazinamide

Poinformuj swojego lekarza o:

- Wszystkich innych leków, jakie bierzesz, w tym o lekach bez recepty
- O wszelkich objawach alergii na leki w przeszłości
- Czy kiedykolwiek chorowałeś na wątrobę

Zanim zastosujesz Pyrazinamide

Pyrazinamide można brać przed lub po jedzeniu. Lekarz lub pielęgniarka omówi z tobą, jaka jest najlepsza pora brania tego leku.

Działania niepożądane

Pyrazinamide, podobnie jak inne leki, może wywołać działania niepożądane:

- Zaburzenia żołądkowe, jak np. mdłości, wymioty lub rozwolnienie
- Objawy jak przy grypie, czyli dreszcze, gorączka, zawroty głowy lub bóle kostne
- Żółtaczka (żółknienie skóry lub oczu) Jeśli zauważysz te objawy, wstrzymaj się z przyjmowaniem wszelkich leków i natychmiast skonsultuj się z lekarzem
- Wysypka lub swędzenie