

Dacă aveți TBC MDR și doriți să știți mai multe despre această boală de la cineva care o are, există o broșură numită The Tuberculosis Survival Handbook de Paul Mayho (a doua ediție). Cartea costă £14,95 și este disponibilă prin librăriile locale, Gazelle book services și www.amazon.co.uk, sau direct de la editură, situl web Merit Publishing International www.meritpublishing.com sau adresa email merituk@aol.com.
Numărul de referință pentru comanda cărții este ISBN 1 873413 14 9.

Notes:

Protejați-vă familia și prietenii de TBC - luați toate medicamentele dvs. pentru TBC

Rețineți că asistenta specializată în TBC este aici pentru a vă ajuta cu tratamentul dvs. Contactați asistenta TBC dacă nu vă simțiți bine după tratament sau dacă există ceva de care nu sunteți sigur în legătură cu medicația dvs.

Asistenta dvs. de TBC este:

Medicul dvs. de la spital este:

Nr. de contact:

Email:

TB Alert este o organizație unică de caritate și de creștere a conștientizării privind tuberculoza în Regatul Unit și în întreaga lume. Noi susținem proiectele din Regatul Unit și din țările în curs de dezvoltare care asigură primirea informațiilor și tratamentului corecte de către mai mulți pacienți. Cu sprijinul dvs., putem obține un impact pozitiv asupra tuberculozei în lume și putem salva mai multe vieți.



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Pentru informații suplimentare sau copii ale acestui pliant, vă rugăm să contactați 01273 234 770 (Numai în timpul orelor de program).

Pentru a face o donație sau a participa ca voluntar în sprijinul TB Alert, vă rugăm să contactați 01273 234 784 (numai în timpul orelor de program).

Sau vizitați situl nostru web la www.tbalert.org

Informațiile oferite în acest pliant privind testele și diagnosticarea tuberculozei sunt concepute pentru a oferi o informare generală despre subiect. Nu sunt concepute ca un înlocuitor pentru cunoștințele, capacitățile și rațiunea asistentei/medicului dvs. Sau a altor profesioniști din domeniul sănătății. Niciuna dintre informațiile cuprinse în acest pliant nu este destinată utilizării pentru decizii privind diagnosticul sau tratamentul. Întrebările și preocupările privind diagnosticul și tratamentul trebuie să fie adresate unui profesionist în domeniul serviciilor medicale.

Lucrare de dezvoltare originală de North West London TB Network



Tuberculoza multirezistentă (TBC MDR)

...a noaptea Febră!!
...ră tuse Febră!!
...Letargie!!
...flata
...spirație puternică noaptea
...se Glande umflate
...greutate inexplicabilă Transpirație puternică
...sa
...Febră!! Pie
...Transpirație puternică noaptea
...sau fără tuse Glande umflate
...sau fără tuse Glande umflate Transpirație puternică noaptea
...Febră!! Febră!! Febră!! Transpirație puternică noaptea Glande
...Letargie!! Febră!! Letargie!! Febră!! Let
...Cu sau fără tuse Glande umflate Transpirație puternică noaptea
...Febră!! Febră!! Febră!! Transpirație puternică noaptea Glande
...Letargie!! Febră!! Letargie!! Febră!! et

Ce este TBC?

Tuberculoza (TBC) este o infecție bacteriană cel mai frecvent localizată în plămâni, dar care poate afecta orice parte a corpului cum ar fi creierul, glandele limfatice, rinichii și oasele.

Cum se ia?

Când cineva care are TBC infectioasă la plamani tuseste, germenii pot ajunge in aer sub forma de mici picături si alte persoane le pot inhala. Persoanele cele mai expuse la TBC sunt cele care locuiesc in aceeasi casa sau apartament cu persoana care are TBC.

Sunt infecțios?

Nu toate persoanele cu TBC au boala infecțioasă. Aveți boala infecțioasă numai dacă TBC este în plămâni sau gât și tușiți cu germenii de TBC (acest lucru se numește flegmă pozitivă). Nu sunteți infecțios pentru alte persoane dacă aveți TBC în orice altă parte a corpului în afară de plămâni și gât. Medicul/asistenta vă poate da mai multe informații.

Ce este tuberculoza multirezistentă (TBC MDR)?

TBC MDR se dezvoltă când devine rezistentă la unul sau două dintre cele mai puternice medicamente folosite în mod normal pentru a trata TBC. Aceasta înseamnă că aceste medicamente nu vor acționa eficient deoarece nu mai pot distruge bacteriile de TBC.

Când suspectați că cineva are TBC MDR?

Probele care conțin germenii de TBC pot fi testate în laborator pentru a vedea dacă aceștia sunt distruși de diferite medicamente. Dacă nu sunt distruși, este posibil ca pacientul să nu se simtă mai bine cu medicamentele pentru TBC obișnuite acest lucru poate sugera prezența TBC MDR.

De ce fac oamenii TBC MDR?

1. TBC poate deveni rezistentă în timpul tratamentului dacă tratamentul luat a fost dintr-un motiv oarecare inadecvat, de exemplu:
 - ⦿ Dacă pacientul nu ia medicamentul regulat așa cum a fost prescris și nu face toată perioada de tratament.
 - ⦿ Dacă pacientul nu poate absorbi complet medicamentul, de exemplu din cauza vomiei.
 - ⦿ Dacă medicamentele nu sunt prescrise sau administrate corect.
 - ⦿ Dacă medicamentele sunt de proastă calitate.
2. TBC poate fi rezistentă de la început deoarece persoana de la care a fost luată infecția avea TBC rezistentă la medicamente.

TBC MDR nu este mai infecțioasă decât TBC obișnuită, dar medicamentele folosite împotriva acesteia sunt mai puțin eficiente și trebuie să fie luate mult mai multă vreme. O persoană care are TBC MDR este prin urmare infecțioasă o perioadă mai lungă decât o persoană cu TBC care este sensibilă la medicamentele obișnuite (TBC sensibilă la medicamente).

De ce este TBC MDR o problemă?

TBC MDR nu este mai infecțioasă decât TBC sensibilă la medicamente, dar este mult mai dificil de tratat.

Medicamentele folosite pentru a trata TBC rezistentă la medicamente au mai multe efecte colaterale și sunt mai puțin eficiente decât medicamentele folosite pentru a trata TBC sensibilă la medicamente. Aceasta înseamnă că pacienții cu TBC MDR vor avea nevoie de o perioadă mai lungă de tratament și se vor simți mai rău. Este mai posibil să necesite tratament cu spitalizare.

Câtă vreme voi fi infecțios?

Depinde de modul în care răspundeți la medicamentele cu care sunteți tratat și fiecare caz de TBC MDR este diferit.

Deoarece TBC este rezistentă la medicamentele obișnuite, puteți fi infecțios mai multe săptămâni sau chiar luni.

Câtă vreme va trebui să fac tratament?

Un tratament pentru TBC sensibilă la medicamente durează cel puțin șase luni. Tratamentul pentru TBC MDR poate dura optsprezece luni sau mai mult.