


Rifinah



Rifinah este o combinație de două medicamente (rifampicină și isoniazidă) într-o singură tabletă.

Înainte de a lua rifinah

Spuneți-i medicului despre:

- Toate celelalte medicamente pe care le luați, inclusiv cele cumpărate fără rețetă de la farmacie
- Orice alergie precedentă la orice alte medicamente
- Dacă ați suferit de orice boală de ficat

Administrarea rifinah

Aceeași procedură ca la rifater

Efecte colaterale

Aceleași ca la rifater

Protejați-vă familia și prietenii de TBC - luați toate medicamentele dvs. pentru TBC

Rețineți că asistenta specializată în TBC este aici pentru a vă ajuta cu tratamentul dvs. Contactați asistenta TBC dacă nu vă simțiți bine după tratament sau dacă există ceva de care nu sunteți sigur în legătură cu medicația dvs.

Asistenta dvs. de TBC este:

Medicul dvs. de la spital este:

Nr. de contact:

Email:

TB Alert este o organizație unică de caritate și de creștere a conștientizării privind tuberculoza în Regatul Unit și în întreaga lume. Noi susținem proiectele din Regatul Unit și din țările în curs de dezvoltare care asigură primirea informațiilor și tratamentului corecte de către mai mulți pacienți. Cu sprijinul dvs., putem obține un impact pozitiv asupra tuberculozei în lume și putem salva mai multe vieți.



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Pentru informații suplimentare sau copii ale acestui pliant, vă rugăm să contactați 01273 234 770 (Numai în timpul orelor de program).

Pentru a face o donație sau a participa ca voluntar în sprijinul TB Alert, vă rugăm să contactați 01273 234 784 (numai în timpul orelor de program).

Sau vizitați situl nostru web la www.tbalert.org

Informațiile oferite în acest pliant privind testele și diagnosticarea tuberculozei sunt concepute pentru a oferi o informare generală despre subiect. Nu sunt concepute ca un înlocuitor pentru cunoștințele, capacitățile și rațiunea asistentei/medicului dvs. sau a altor profesioniști din domeniul sănătății. Niciuna dintre informațiile cuprinse în acest pliant nu este destinată utilizării pentru decizii privind diagnosticul sau tratamentul. Întrebările și preocupările privind diagnosticul și tratamentul trebuie să fie adresate unui profesionist în domeniul serviciilor medicale.

Lucrare de dezvoltare originală de North West London TB Network



**Rifater, ethambutol,
Pirazinamidă și rifinah**



Rifater



Rifater este o combinație de trei medicamente (rifampicină, isoniazidă și pirazinamidă) într-o singură tabletă.

Înainte de a lua rifater

Spuneți-i medicului despre:

- Toate celelalte medicamente pe care le luați, inclusiv cele cumpărate fără rețetă de la farmacie
- Orice alergie precedentă la orice alte medicamente
- Dacă ați suferit de orice boală de ficat

Administrarea rifater

Rifater este cel mai bine absorbit dacă stomacul este gol. Luați rifater cu o jumătate de oră înainte de masă. Medicul sau asistenta vor discuta cu dvs. ora cea mai potrivită din zi la care să luați rifater.

Efecte colaterale

Rifater, ca toate celelalte medicamente, poate avea unele efecte colaterale:

- Probleme la stomac cum ar fi grețuri (disconfort) vomă sau diaree
- Simptome de gripă cum sunt frisoanele, febra, amețea și dureri în oase
- Gălbănare (îngălbenirea pielii sau a ochilor) Dacă observați acest lucru, întrerupeți toate medicamentele și solicitați imediat sfatul medicului
- Înroșire a pielii și mâncărime
- Tulburări menstruale
- Neuropatie periferică (înțepături și furnicături în degetele de la mâini și picioare)

- Secrețiile corpului (urina, saliva, sperma, secreția vaginală) vor fi portocaliu-roșcate. Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare; dacă urina este întunecată la culoare înainte de doză de rifater, anunțați medicul sau asistenta. Lentilele de contact pot fi decolorate.
- Eficiența contraceptivelor hormonale (orale, implanturi sau altele) este redusă. Veți avea nevoie de metode de contracepție alternative sau suplimentare; cereți sfatul medicului sau al asistentei.

Ethambutol



Înainte de a lua ethambutol

Spuneți-i medicului despre:

- te celelalte medicamente pe care le luați, inclusiv cele cumpărate fără rețetă de la farmacie
- Orice alergie precedentă la orice alte medicamente


Administrarea ethambutol

Ethambutol poate fi luat înainte sau după ce măncați. Medicul sau asistenta vor discuta cu dvs. ora adecvată pentru a lua ethambutol.

Efecte colaterale:

Ethambutol poate cauza rar tulburări virale (încețoșare a vederii/tulburări la perceperea culorilor roșu/verde). Medicul sau asistenta va programa un examen oftalmologic simplu înainte de a începe tratamentul cu ethambutol. Dacă aveți tulburările de vedere menționate mai sus în timp ce luați ethambutol, întrerupeți tratamentul și informați imediat medicul sau asistenta.

Pirazinamide



Înainte de a lua pirazinamidă

Discutați cu medical dumneavoastră despre:

- Toate celelalte medicamente pe care le luați, inclusiv cele cumpărate fara rețeta de la farmacie
- Orice alergie anterioară la orice alte medicamente
- Dacă ați suferit de orice boală de ficat

Administrarea pirazinamidei

Pirazinamica poate fi luată înainte sau după masă, Medicul sau asistenta va discuta cu dumneavoastră cea mai potrivită oră la care să luați Pirazinamidă.

Efecte colaterale

Ca toate celelalte medicamente, poate avea unele efecte colaterale:

- Probleme la stomac cum ar fi grețuri (disconfort) vomă sau diaree
- Simptome de gripă cum sunt frisoanele, febra, amețea și dureri în oase
- Gălbănare (îngălbenirea pielii sau a ochilor) Dacă observați acest lucru, întrerupeți toate medicamentele și solicitați imediat sfatul medicului
- Înroșire a pielii și mâncărime