


Rifinah



ਰਿਫਨਾਹ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੈ
(ਰਿਫਾਮਪਾਈਸਿਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਨਾਈਆਜਿਡ)।

ਰਿਫਨਾਹ (Rifinah) ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ :

- ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ
- ਕੋਇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਨਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ

ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਜਿਸਤਰਾਂ ਰਿਫਾਟਰ

ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ

ਉਹੀ ਜੋ ਰਿਫਾਟਰ ਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਬਚਾਉ - ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀ.ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੋ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟੀ.ਬੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀ.ਬੀ. ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ.ਬੀ ਨਰਸ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ:

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:

ਈ-ਮੇਲ:

TB Alert ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਕੁਲੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਕੁਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01273 234030

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ **01273 234 770** (ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ)।

ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਵੈਮਸੇਵੀ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ ਅਲਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ **01273 234 784** (ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ)।

ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tbalert.org ਤੇ ਜਾਓ

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤੇ ਇੱਕੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਿਊਬਰਕੁਲੋਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਜਰਬੇ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਡਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਇਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਲੰਦਨ ਟੀ.ਬੀ. ਨੋਟਵਰਕ ਦਵਾਰਾ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ

ਭਾਰਤੀ ਭੂ ਸਿਮਰਿਟਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ, ਟਿਊਬਰਕੁਲੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਕੁਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।



ਰਿਫਾਟਰ, ਇਥਾਮਬਿਊਟੋਲ,
ਪਾਈਰਾਜਾਇਨਾਮਾਈਡ
ਅਤੇ ਰਿਫਨਾਹ
(Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide and Rifinah)



Rifater



ਰਿਫਾਟਰ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਰਿਫਾਮਪਾਈਸਿਨ, ਆਈਸੋਨਾਇਆਜਿਡ ਅਤੇ ਪਾਈਰਾਜਾਇਨਾਮਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਰਿਫਾਟਰ (Rifater) ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ:

- ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ
- ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਾਟਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ

ਰਿਫਾਟਰ ਵਧੀਆ ਘੁਲਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਥ ਤੋਂ ਫੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ

ਰਿਫਾਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲੀ (ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ) ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ
- ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਥਾ ਬੁਖਾਰ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ
- ਪੀਲੀਆ (ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ
- ਚਮੜੀ ਦੀ ਛਪਾਕੀ ਅਤੇ ਖਾਰਿਸ਼
- ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਗੜਬੜੀ
- ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਤੰਤੂ ਵਿਗਾੜ (ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਭਾਂ)

- ਪੇਸ਼ਾਬ,ਬੁੱਕ,ਸੀਮਨ,ਵੇਜਾਈਨਲ,ਤਰਲ) ਸੰਤਰੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰਿਫਾਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਨਜ ਵੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹਾਰਸੋਨਲ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ (ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ,ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

Ethambutol



ਈਥਾਮਬਿਉਟੋਲ (Ethambutol) ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ :

- ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ
- ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਈਥਾਮਬਿਉਟੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਈਥਾਮਬਿਉਟੋਲ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਥ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਫੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਮਬਿਉਟੋਲ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਸਕਦੇ ਹਨ। (ਉਦਲਪਨ ਜਾਂ ਲਾਲ/ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਗਾੜ) ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਈਥਾਮਬਿਉਟੋਲ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਵਿਗਾੜ ਈਥਾਮਬਿਉਟੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

Pyrazinamide



ਪਾਈਰਾਜਾਇਨਾਮਾਈਡ (Pyrazinamide) ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ:

- ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ
- ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਰਾਜਾਇਨਾਮਾਈਡ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪਾਈਰਾਜਾਇਨਾਮਾਈਡ ਈਥਾਮਬਿਉਟੋਲ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਥ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਫੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ

ਪਾਈਰਾਜਾਇਨਾਮਾਈਡ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲੀ (ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ) ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ
- ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਥਾ ਬੁਖਾਰ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ
- ਪੀਲੀਆ (ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ
- ਚਮੜੀ ਦੀ ਛਪਾਕੀ ਅਤੇ ਖਾਰਿਸ਼