

Co HIV i AIDS mają wspólnego z gruźlicą?

Większość chorych na gruźlicę w Zjednoczonym Królestwie, nie jest również zarażona HIV. Lecz w wielu krajach HIV/AIDS i gruźlica razem występują. HIV uszkadza system obronny organizmu, co ułatwia inwazję gruźlicy.

Niektórzy zarażają się gruźlicą mieszkając w kraju częstego występowania gruźlicy i HIV. Dlatego te choroby zakaźne są blisko związane ze sobą - osoba, która zaraziła się jedną z nich, mogła być narażona na zakażenie drugą.

Co to jest HIV/AIDS?

- ⊙ HIV to wirus ludzkiego niedoboru odporności. AIDS oznacza zespół nabytego niedoboru odporności
- ⊙ HIV jest zakażeniem osłabiającym system obronny organizmu przed chorobami, a zwłaszcza infekcjami
- ⊙ Gdy dochodzi do rozwoju pewnych innych chorób przy zakażeniu HIV, chory ma AIDS

Czy HIV występuje często?

HIV występuje na całym świecie. Są pewne obszary, jak np. Afryka subsaharyjska, Azja południowa i Europa wschodnia, gdzie HIV występuje częściej.

Szacuje się, że w Zjednoczonym Królestwie żyje 30 000 osób z HIV i liczba ta wzrasta, gdyż po raz pierwszy corocznie przybywa 6 500 osób z dodatnim wynikiem na HIV. Najbardziej powszechnym sposobem przekazania zakażenia w świecie jest uprawianie seksu przez mężczyznę i kobietę, chociaż liczba przypadków pomiędzy współzżyjącymi mężczyznami pozostaje nadal wysoka.

Czy istnieje lekarstwo na HIV i AIDS?

Skutki działania HIV mogą być kontrolowane i nawet odwrócone przy pomocy leków anty-HIV. Obecnie nie istnieje lekarstwo na HIV lub AIDS. Jednak, badania wykazują, że osoby stosujące leki anty-HIV żyją dłużej i lepiej się czują. Jeśli wiesz, że masz dodatni wynik na HIV, możesz podjąć działania zmniejszające ryzyko przekazania choroby innym.

Jak przekazuje się HIV?

- ⊙ Poprzez uprawianie seksu waginalnego lub analnego bez prezerwatywy. Seks oralny bez ochrony stanowi też pewne ryzyko
- ⊙ Przez matkę dziecku podczas ciąży, w trakcie porodu lub przy karmieniu piersią
- ⊙ Używając tych samych igieł, strzykawek i innych narzędzi do podawania leków
- ⊙ Poprzez podanie zakażonej krwi lub produktów krwiopochodnych

Badania na HIV

Na czym polega badanie?

Mała próbka krwi zostaje pobrana na przedramieniu i wysłana do badania w laboratorium.

Mogłeś już przeprowadzać badania krwi w przychodni, ale badanie na HIV można tylko przeprowadzić za twoją zgodą. Wszystkie badania na HIV są bezpłatne.

Ile czasu muszę czekać na wynik?

Zwykle wyniki są dostępne po 3 dniach roboczych. Bez względu na wynik, zostanie on przekazany ci osobiście przez pracownika medycznego; wyników nie można przekazywać przez telefon, a także kopie wyniku na papierze zwykle nie są wydawane pacjentom.

Co wynik badania oznacza?

Ujemny wynik badania na HIV

Oznacza, że nie masz HIV, o ile nie byłeś narażony na zakażenie tym wirusem w ciągu 3 miesięcy przed badaniem. Jeśli mogłeś być narażony w ostatnich 3 miesiącach, badanie może nie wykryć obecności HIV. Zaleca się przeprowadzenie badania 3 miesiące po narażeniu na zarażenie się HIV.

Dodatni wynik badania na HIV

Masz HIV. Wynik potwierdza się w drugim badaniu (choć pomyłka jest mało prawdopodobna). Przeprowadzone zostanie poufne spotkanie ze specjalistą w dziedzinie HIV/AIDS, w celu udzielenia ci wsparcia w przyjęciu diagnozy i omówienia dalszego leczenia.

Kto będzie znał wynik badania?

Wynik badania jest ściśle poufny, wyłącznie do twojej wiadomości i personelu zajmującego się twoim leczeniem. Bez twojej zgody, nikt nie zostanie o tym poinformowany. Informacja o wyniku nie jest podawana twojemu partnerowi, żadnemu członkowi rodziny, znajomym, pracodawcy, gospodarzowi wynajmującemu ci mieszkanie, agendom rządowym, MSW (Home Office) czy Urzędowi Imigracyjnemu (Immigration Service).

Gdzie mogę zrobić badanie na HIV lub omówić wynik badania?

Badanie można przeprowadzić w przychodni przeciwgruźliczej, a także w innych placówkach możesz zlecić badanie i omówić sprawy budzące twój niepokój.