

Rifinah



Rifinah es una combinación de dos medicamentos (Rifampicina e Isoniazida) en una tableta.

Antes de ingerir Rifinah

Informe a su médico :

- Sobre todos los medicamentos que está tomando, inclusive sobre aquellos que usted compra en su farmacia local.
- Si es alérgico a algún medicamento.
- Si padeció de alguna enfermedad renal.

Ingesta de Rifinah

Siga el mismo procedimiento que con el Rifater

Efectos secundarios

Los mismos que causa el Rifater

Proteja a su familia y amigos de la TBC – tome sus medicamentos

Recuerde que su enfermero TBC está a su disposición para ayudarlo y asesorarlo durante su tratamiento. Por favor contacte a su enfermero si no se siente bien durante el tratamiento o si tiene alguna duda respecto a sus medicamentos.

Su enfermero es:

Su médico de hospital es:

Nro. de contacto:

Correo electrónico:

TB Alert es una organización benéfica que se dedica a la concienciación sobre la Tuberculosis en el Reino Unido y apoya la labor del NHS brindando información a los pacientes. Ayudamos en proyectos en países en desarrollo para asegurar que todos los pacientes reciban el tratamiento adecuado. Con su ayuda, podemos crear un impacto positivo a nivel mundial contra la Tuberculosis y así salvar más vidas.



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Para obtener más información o más copias de este folleto, comuníquese al 01273 234 770 (sólo en horario de oficina).

Para realizar una donación u ofrecerse como voluntario para ayudar en TB Alert, comuníquese al 01273 234 784 (sólo en horario de oficina).

O visite nuestro sitio web en www.tbalert.org

La información contenida en estos folletos respecto del diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis Latente intenta proveer información general sobre el tema. No es su objetivo sustituir el conocimiento, experiencia, capacidad o criterio de su enfermero/médico u otros profesionales en el cuidado de la salud. La información contenida en el presente folleto no tiene como fin ser utilizada en la toma de decisiones para diagnóstico o tratamiento. Las dudas e inquietudes sobre el diagnóstico y tratamiento se deberán consultar con un profesional de la salud.

Proyecto Original desarrollado por la Red Contra la TBC en North West London.



Rifater, Ethambutol, Pirazinamida y Rifinah



Rifater



El Rifater es una combinación de tres medicamentos (Rifampicina, Isoniazida y Pirazinamida) en una tableta.

Antes de ingerir Rifater

Informe a su médico:

- ⊙ Sobre todos los medicamentos que está tomando, inclusive aquellos que compra en su farmacia local.
- ⊙ Si es alérgico a algún medicamento.
- ⊙ Si padeció de alguna enfermedad renal.

Ingesta de Rifater

El Rifater se absorbe mejor con el estómago vacío. Tome el Rifater media hora antes de comer. Su médico o enfermero le indicará cuál es el momento del día más adecuado para su consumo.

Efectos secundarios

La ingesta del Rifater, como sucede con otros medicamentos, podría causar efectos secundarios:

- ⊙ Problemas estomacales como náuseas, vómitos y diarrea.
- ⊙ Síntomas de resfrío como escalofríos, fiebre, mareos y dolor de huesos.
- ⊙ Ictericia (coloración amarillenta de la piel o de los ojos). Si esto ocurre, deje de tomar los medicamentos y busque atención médica inmediatamente.
- ⊙ Erupciones en la piel y picor.
- ⊙ Desarreglos menstruales.
- ⊙ Neuropatías periféricas (sensación de pinchazos en los dedos de las manos o de los pies).

- ⊙ Las secreciones corporales (orina, saliva, semen, fluidos vaginales) podrían volverse anaranjadas o rojizas. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación. Si su orina es oscura antes de ingerir su dosis de Rifater, informe a su médico o enfermero. Las lentes de contacto también podrían decolorarse.
- ⊙ La eficacia de los anticonceptivos hormonales (por vía oral, implantados u otros) se reduce. Necesitará utilizar métodos alternativos o adicionales, consulte a su médico o enfermero sobre el tema.

Ethambutol



Antes de ingerir Ethambutol

Informe a su médico:

- ⊙ Sobre todos los medicamentos que está tomando, inclusive sobre aquellos que usted compra en su farmacia local.
- ⊙ Si es alérgico a algún medicamento.

Ingesta de Ethambutol

El Ethambutol puede ingerirse antes o después de las comidas. Su médico o enfermero le indicará cuál es el momento adecuado para su consumo.

Efectos secundarios:

El Ethambutol causa, rara vez, alteraciones visuales (visión borrosa, visión de color rojo o verde). Su médico o enfermero arreglará un simple estudio de la vista antes de comenzar el tratamiento con Ethambutol. Si desarrolla alteraciones visuales durante la ingesta de Ethambutol, informe a su médico o enfermero inmediatamente.

Pyrazinamide



Antes de ingerir Pirazinamida

Informe a su médico:

- ⊙ Sobre todos los medicamentos que está tomando, inclusive sobre aquellos que usted compra en su farmacia local.
- ⊙ Si es alérgico a algún medicamento.
- ⊙ Si padeció de alguna enfermedad renal.

Ingesta de Pirazinamida

El Pirazinamida se puede ingerir antes o después de las comidas. Su médico o enfermero le indicará cuál es el momento adecuado para su consumo.

Efectos secundarios

La ingesta de Pirazinamida, como sucede con otros medicamentos, podría causar efectos secundarios:

- ⊙ Problemas estomacales como náuseas, vómitos y diarrea.
- ⊙ Síntomas de resfrío como escalofríos, fiebre, mareos y dolor de huesos.
- ⊙ Ictericia (coloración amarillenta de la piel o de los ojos) Si esto ocurre, deje de tomar el medicamento y busque atención médica inmediatamente.
- ⊙ Erupciones en la piel y ardor.