

Rifinah



ரிஃபினாஹ் இரண்டு மருந்துகள் (ரிஃபாம்பிசின் மற்றும் ஐசோனியாஸிட்) கலந்த ஒரு மாத்திரை.

ரிஃபினாவை எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்

உங்கள் மருத்துவரிடம்:

- ஜினீஸீம் ஹெக்ஸாசுஃபீ ஸீமீபீவீநீவீஸீமீஹ் ஸீமீமீ மீலீம் டெனீஸீமீ மீலீஸீமீ மீஸீமீஹ்ஹீஸீஹ் ஸீஸீபீ றீமீஸீஸீமீ மீலீஸீமீ வீஸீ மீலீம் டெனீஸீமீ ஜீநீஸீநீம்
- ஏற்கனவே ஏதேனும் மருந்து உங்களுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் கூறுங்கள்
- உங்களுக்கு நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய் இருந்தால் அதனையும் கூறுங்கள்

உங்கள் ரிஃபினாவை எடுத்துக் கொள்ளுதல்

ரிஃபேட்டர் எடுத்துக் கொள்ளும் முறையைப் போன்றது.

பக்க விளைவுகள்

ரிஃபேட்டரைப் போன்றது

காசநோயிலிருந்து உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் பாதுகாப்பு அளியுங்கள் - அனைத்து காசநோய் மருந்துகளையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள்

உங்களுக்கு உதவி செய்யவும் அறிவுரை வழங்கவும் காசநோய் செவிலியர் இருக்கிறார் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு செய்யப்பட்ட சிகிச்சை திருப்திகரமாக இல்லையென்றாலும் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய மருந்து சம்பந்தமாக ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் உங்களுடைய டி.பி. செவிலியரைத் தொடர்புக் கொண்டு கேளுங்கள்.

உங்கள் காசநோய் செவிலியர் பெயர்:

உங்கள் மருத்துவர் பெயர்:

தொடர்புக் கொள்ள வேண்டிய எண்:

மின்னஞ்சல்:

TB Alert என்பது காசநோய் பற்றி உலகளவில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் யூ.கே.வில் உள்ள தொண்டு நிறுவனம். யூ.கே.விலும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலும் நோயாளிகள் சரியான தகவல்களும் சிகிச்சையும் பெற வேண்டும் என்பதற்கான செயல்திட்டங்களுக்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம். உங்கள் ஆதரவுடன் காசநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை உலகம் முழுவதும் உண்டாக்கி நிறைய உயிர்களை எங்களால் காப்பாற்ற முடியும்.



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
தொலைபேசி: 01273 234030

மேலும் விவரங்களுக்கு அல்லது இந்த பிரசுரத்தின் பிரதிகளைப் பெறுவதற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 01273 234 770 (அலுவலக நேரத்தில் மட்டும்).

டி.பி.அலெர்ட்டிற்கு நன்கொடை வழங்க அல்லது தொண்டு செய்ய விரும்புவர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 01273 234 784 (அலுவலக நேரத்தில் மட்டும்).

அல்லது www.tbalert.org என்கிற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்

இந்தப் பிரசுரத்தில் காசநோய் மற்றும் ஹெக்ஸி.பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை சம்பந்தமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு இவற்றைப் பற்றிய பொதுவான தகவல்களை அளித்திருக்கும். நோயாளிகளின் நலனில் அக்கறைக் கொண்டுள்ள மருத்துவர்களின் அறிவு, நிபுணத்துவம், திறமை ஆகியவற்றை இது எட்டு செய்யாது. பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை சம்பந்தமான சந்தேகங்களை உடல் நல பாதுகாப்பு நிபுணர்களிடம் கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

இது வட மேற்கு லண்டன் டி.பி. நெட்வொர்க்கால் செய்யப்பட்டது.

இது இங்கிலாந்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட, உத்தியோகபூர்வமான டி.பி. நெட்வொர்க்கால் செய்யப்பட்டது. 1071866 வடிவமைப்பு: டெர்ச்சாப், லண்டன் 020 8352 8300



ரிஃபேட்டர்,
எத்தாம்புட்டால்,
பைராஸினமைட் மற்றும்
ரிஃபினாஹ்

இரவல்
ப்படியாக வி
மில்லாமல் உ
காய்ச்சல்!! இரவல்
நமலுடன் அல்லது இல்லாமல் இரவில்
காய்ச்சல்!! காய்ச்சல்!! காய்ச்சல்!!
சோர்வு!! காய்ச்சல்!! சோர்வு!! அதிகப்படியான
இருமலுடன் அல்லது இல்லாமல்
காய்ச்சல்!! காய்ச்சல்!! காய்ச்சல்!! இரவில் அதிகப்படியான
காய்ச்சல்!! காரணமில்ல



Rifater



ரிஃபேட்டர் மூன்று மருந்துகள் (ரிஃபாம்பிசின், ஐசோனியாஸிட் மற்றும் பைராஸினமைட்) கலந்த ஒரு மாத்திரை.

ரிஃபேட்டரை எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்

உங்கள் மருத்துவரிடம்:

- நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் மற்ற அனைத்து மருந்துகளைப் பற்றியும் மருந்துக் கடைகளில் இருந்து வாங்கும் மருந்தினைப் பற்றியும் கூறுங்கள்.
- ஏற்கனவே ஏதேனும் மருந்து உங்களுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் கூறுங்கள்.
- உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏதேனும் கல்லீரல் சம்பந்தமான நோய் இருந்திருந்தால் அதனையும் கூறுங்கள்.

ரிஃபேட்டரை எடுத்துக் கொள்ளும் விதம்

வயிறு காலியாக இருக்கும் போது ரிஃபேட்டரை எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. அப்போது தான் ரிஃபேட்டர் நன்றாக உட்கிரகிக்கப்படும். நீங்கள் உணவை உண்பதற்கு அரைமணி நேரம் முன்பு ரிஃபேட்டரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் மருத்துவர் அல்லது செவிலியர் உங்களிடம் ரிஃபேட்டர் எடுத்துக் கொள்வதற்கு ஏற்ற நேரத்தைப் பற்றி கலந்துப் பேசுவார்.

பக்க விளைவுகள்:

ரிஃபேட்டருக்கும் மற்ற மருந்துகளைப் போலவே பக்க விளைவுகள் உண்டு:

- வயிறு கோளாறு, வாந்தி மற்றும் வயிற்று போக்கு
- இன்ஃப்லூயன்ஸாவின் அறிகுறிகளான குளிர், காய்ச்சல், மயக்கம் மற்றும் எலும்பு வலி
- மஞ்சள் காமாலை (சருமம் மற்றும் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாதல்) உங்களுக்கு இந்த அறிகுறிகள் தெரிந்தால், உடனடியாக மருந்துகளை நிறுத்திவிட்டு மருத்துவரை சந்தியுங்கள்
- சருமம் அறிப்பெடுத்தல்
- மாதவிடாய் தவறுதல்
- பெரிஃபெரல் நியூரோபதி (கை விரல்களிலோ கால் விரல்களிலோ இருக்கும் ஊசிகள்)

- உடலிலிருந்து வெளிவரும் (சிறுநீர், உமிழ்நீர், விந்து) ஆகியவை ஆரஞ்சு-சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இது சாதாரணமானது. இதைப் பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை. ரிஃபேட்டரை எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்பே உங்கள் சிறுநீர் கருப்பாக இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடமோ செவிலியரிடமோ கூறுங்கள். காண்டாக்ட் லென்ஸுகளும் நிறம் மாறலாம்
- கருத்தடை சாதனங்களின் செயல்பாடு குறையும். உங்களுக்கு கூடுதல் முறையோ வேறு ஏதும் மாற்று முறையோ தேவைப்படும். உங்கள் மருத்துவர் அல்லது செவிலியரிடம் ஆலோசனைப் பெறுங்கள்

Ethambutol



ரிஃபேட்டரை எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்

- நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் மற்ற அனைத்து மருந்துகளைப் பற்றியும் கூறுங்கள். மருந்துக் கடைகளில் இருந்து வாங்கும் மருந்தினைப் பற்றியும் கூறுங்கள்
- ஏற்கனவே ஏதேனும் மருந்து உங்களுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் கூறுங்கள்

எத்தாம்புட்டாலை எடுத்துக் கொள்வது

எத்தாம்புட்டாலை சாப்பிடுவதற்கு முன்போ சாப்பிட்டப் பிறகு எடுத்துக் கொள்ளலாம். எத்தாம்புட்டாலை எடுத்துக் கொள்வதற்கான சரியான நேரத்தைப் பற்றி உங்கள் மருத்துவர் அல்லது செவிலியர் உங்களிடம் கலந்துப் பேசுவார்.

பக்க விளைவுகள்:

எத்தாம்புட்டால் கண்களைப் பாதிப்பது (மங்கல் மற்றும் சிகப்பு/பச்சை நிறம் தொந்தரவு செய்வது) அரிது. எத்தாம்புட்டாலை எடுத்துக் கொள்ளத் துவங்குவதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துவர் அல்லது செவிலியர் உங்கள் கண் பரிசோதனைக்கு ஏற்பாடு செய்வார். எத்தாம்புட்டாலை எடுத்துக் கொள்கையில் உங்களுக்கு மேலே கூறப்பட்டுள்ள பிரச்சனைகள் வரத் துவங்கினால், எத்தாம்புட்டாலை எடுத்துக் கொள்வதை நிறுத்தி விடுங்கள். உங்கள் மருத்துவரையோ செவிலியரையோ உடனே அணுகுங்கள்.

Pyrazinamide



பைராஸினமைடை எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்

உங்கள் மருத்துவரிடம்:

- நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் மற்ற அனைத்து மருந்துகளைப் பற்றியும் கூறுங்கள். மருந்துக் கடைகளில் இருந்து வாங்கும் மருந்தினைப் பற்றியும் கூறுங்கள்
- ஏற்கனவே ஏதேனும் மருந்து உங்களுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் கூறுங்கள்
- உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏதேனும் கல்லீரல் சம்பந்தமான நோய் இருந்திருந்தால் அதனையும் கூறுங்கள்

பைராஸினமைடை எடுத்துக் கொள்ளும் விதம்

பைராஸினமைடை சாப்பிடுவதற்கு முன்போ சாப்பிட்டப் பிறகு எடுத்துக் கொள்ளலாம். பைராஸினமைடை எடுத்துக் கொள்வதற்கான சரியான நேரத்தைப் பற்றி உங்கள் மருத்துவர் அல்லது செவிலியர் உங்களிடம் கலந்துப் பேசுவார்.

பக்க விளைவுகள்:

பைராஸினமைடுக்கும் மற்ற மருந்துகளைப் போலவே பக்க விளைவுகள் உண்டு:

- வயிறு கோளாறு, வாந்தி மற்றும் வயிற்று போக்கு
- இன்ஃப்லூயன்ஸாவின் அறிகுறிகளான குளிர், காய்ச்சல், மயக்கம் மற்றும் எலும்பு வலி
- மஞ்சள் காமாலை (சருமம் மற்றும் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாதல்) உங்களுக்கு இந்த அறிகுறிகள் தெரிந்தால், உடனடியாக மருந்துகளை நிறுத்திவிட்டு மருத்துவரை சந்தியுங்கள்.
- சருமம் அறிப்பெடுத்தல்