

காசநோய் என்றால் என்ன?

காசநோய் (டி.பி.) பாக்டீரியாவால் பரவக் கூடியது. இவை நுரையீரலில் காணப்படுகிறது. இது மூளை, நிணநீர் சுரப்பி, சிறுநீரகம் மற்றும் எலும்புகள் போன்ற உடலின் பல பகுதிகளை பாதிக்கக் கூடியது.

இது எப்படி வருகிறது?

நுரையீரல் காசநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருமினால் கிருமிகள் காற்றில் பரவுகின்றன. இதனை மற்றவர்கள் சுவாசிக்கக் கூடும். காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் ஒரே வீட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு காசநோய் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.

என்னால் நோய் பரவுமா?

காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவராலும் நோய் பரவாது. உங்களுக்கு நுரையீரல் அல்லது தொண்டையில் காசநோய் இருந்து, காசநோய் கிருமிகள் இருமல் மூலமாக வெளிவந்தால் காசநோய் பரவும் (இதுதான் ஸ்மியர் பாசிட்டிஸ்). நுரையீரலையும் தொண்டையையும் தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு எங்கும் காசநோய் இருந்தால் உங்கள் மூலமாக நோய் பரவாது. உங்கள் மருத்துவர்/செவிலியர் உங்களுக்குக் கூடுதல் தகவல்களைத் தரலாம்.

காசநோய்க்கு எப்படி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது?

காசநோய்க்கு குறைந்தது ஆறு மாசமாவது மருந்து சாப்பிட்டு சிகிச்சை எடுத்து கொள்ள வேண்டும். ஏதேனும் மருந்து காசநோய் கிருமியை அழிக்கவில்லை என்றாலும் காசநோய் உங்கள் உடலில் எங்கு இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்தும் சிகிச்சைக்கான காலம் மாறுபடும். மருத்துவர் கூறியபடி மாத்திரையை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் சிகிச்சைக் காலம் நீட்டிக்கப்படும்.

காசநோய்க்கு வழக்கமான சிகிச்சை என்ன?

உங்கள் காசநோய் மருத்துவர் அல்லது செவிலியர் நான்குவிதமான மருந்துகளை இரண்டு மாதத்திற்கு கொடுப்பார். அவை:

- ரிஃபாம்பிசின்
- ஐஸோனியாஸிட்
- பைராஸினாமைட்
- எத்தாம்புட்டால்

(ஐஸோனியாஸிட், ரிஃபாம்பிசின், பைராஸினாமைட் கலந்தது தான் ரிஃபேப்டர்).

சில பேர் இரண்டு வாரங்கள் மருந்து எடுத்துக் கொண்டாலே அவர்கள் மூலமாக காசநோய் பரவாது.

இரண்டு மாதங்கள் கழித்து, மருத்துவர் வழக்கமாக மருந்தினை குறைத்துவிடுவார்:

- ரிஃபாம்பிசின்
- ஐஸோனியாஸிட்

(ரிஃபாம்பிசின் மற்றும் ஐஸோனியாஸிட் சேர்ந்தது தான் ரிஃபினாஹ்).

காசநோய்க்கான மருந்துகள் பாதுகாப்பானவையா?

மற்ற மருந்துகளைப் போலவே இதற்கும் பக்க விளைவுகள் உண்டு. சில பக்க விளைவுகள் சாதாரணமானது. சில மிகவும் அபாயகரமானது. பல்வேறு மாத்திரைகள் மற்றும் அதன் பக்க விளைவுகளைப் பற்றிய தகவல்களை காசநோய் மருத்துவமனை ஊழியர்களிடமிருந்துப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ரிஃபாம்பிசின், ஐஸோனியாஸிட், பைராஸினாமைட், எத்தாம்புட்டால் ஆகியவற்றை கர்ப்பமாக இருக்கையில் பாதுகாப்பாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

உங்கள் மருத்துவர் அல்லது செவிலியர் நீங்கள் பரிசோதனையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு சில பரிசோதனைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்வார்.

நீங்கள் ஏதேனும் ஹார்மோனல் கருத்தடை முறைகளை (வாய்வழி, பதிதல் அல்லது மற்ற முறைகள்) பயன்படுத்துகிறீர்கள் எனில், அவற்றின் செயல்திறனை ஸிஸ்டீம்மீ மீக்ஸி குறைத்துவிடும் என்பதால் அவற்றைப் பற்றி நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும்.

நான் எப்போதெல்லாம் மருந்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும்?

தினமும் மருந்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் ஒரு வேளை மருந்தை எடுத்து கொள்ள மறந்தாலும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்த உடனேயே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த வேளைக்கான மாத்திரையை சாப்பிடும்போது முந்தைய வேளைக்கான மாத்திரையை சாப்பிடவில்லை என்று நினைவு வந்தால் முந்தைய வேளைக்கான மாத்திரையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரே வேளையில் இரண்டு வேளைக்கான மருந்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படி நடந்தால் உங்கள் செவிலியர்/மருத்துவரிடம் கூறுங்கள்.

நான் ஏன் காசநோய் மருந்தைத் தொடர்ந்து எடுத்து கொள்ள வேண்டும்?

காசநோய் கிருமிகள் மெதுவாக அழிக்கப்படுகின்றன. அனைத்து காசநோய் கிருமிகளையும் அழிப்பதற்கு குறைந்தது ஆறு மாதங்கள் ஆகலாம். உங்களுக்கு குணமாகியிருக்கலாம், காசநோய்க்குண்டான அறிகுறி போய் இருக்கலாம். ஆனால், மருத்துவர் உங்களுக்கான சிகிச்சையை நிறுத்தும் வரை நீங்கள் தொடர்ந்து மருந்தினை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மிக விரைவில் உங்கள் சிகிச்சையை நிறுத்திவிடுவது அல்லது மருந்தினை வழக்கமாக எடுத்து கொள்ளாமல் இருப்பது மிகவும் அபாயகரமானது. இதனால் உங்களுக்கு நோய் அதிகமாகக் கூடும். சில சமயம் இதனை குணப்படுத்தவே முடியாமல் போகலாம்.

காசநோய் மருந்தை எடுத்து கொள்ளும் போது நான் சில உணவுகளையோ மற்ற மருந்துகளையோ தவிர்க்க வேண்டுமா?

இல்லை, நீங்கள் உங்களுக்குப் பிடித்ததை சாப்பிடலாம். ஆனால் குடிப்பழக்கத்தை கைவிட வேண்டும்.

நீங்கள் மற்ற மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொண்டிருந்தால் அவசியம் மருத்துவரிடம் கூற வேண்டும்.