


Rifinah



Rifinah iki ilacın (Rifampicin ve Isoniazid) bir tabletteki bileşimidir.

Rifinah almadan önce

Doktorunuza aşağıdakileri söyleyin:

- Eczaneden reçetesiz aldığınız ilaçlar dâhil aldığınız diğer bütün ilaçlar
- Daha önce herhangi bir ilaca karşı gösterdiğiniz alerji
- Daha önce yaşadığınız herhangi bir böbrek rahatsızlığı

Rifinah'ınızı almak

Rifater'i alma prosedürüyle aynı

Yan etkiler

Rifater'le aynı

Ailenizi ve arkadaşlarınızı TB'den koruyun – bütün ilaçlarınızı alın.

TB Hemşiremizin tedaviniz boyunca size yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için hazır olduğunu **hatırlayın**. Eğer tedaviniz esnasında kendinizi kötü hisseder ya da ilaçlarınızla ilgili emin olmadığınız herhangi bir durum olursa lütfen TB Hemşirenize danışın.

TB Hemşireniz:

Hastane Doktorunuz:

İletişim no:

Email:

TB Alert İngiltere'nin dünya çapındaki Tüberküloz hakkındaki farkındalığını arttıran özgün bir dayanışmadır. İngiltere'de ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla hastanın daha doğru bilgilendirme ve tedaviyi almasını temin eden projeleri destekliyoruz. Desteğinizle Tüberküloz üzerinde dünya çapında pozitif bir etkiye bulunabilir ve daha fazla hayatı kurtarabiliriz.



TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Daha fazla bilgi ya da bu broşürün kopyaları için lütfen 01273 234 770 ile (sadece mesai saatlerinde) iletişime geçin.

TB Alert'na bağış yapmak ya da gönüllü olmak için lütfen 01273 234 784 ile (sadece mesai saatlerinde) iletişime geçin.

Ya da web sitemizi ziyaret edin: www.tbalert.org

Bu broşürde Tüberküloz testleri ve teşhisiyle ilgili verilen bilgilerin konu hakkında genel bilgi vermesi amaçlanmıştır. Hemşirenizin/doktorunuzun ya da diğer sağlık uzmanlarının bilgisi, yeteneği ve kararları yerine kullanılması amaçlanmamıştır. Bu broşürde içerilen bilgilerin hiçbirisi teşhis ya da tedavide karar vermede kullanılmaz. Teşhis ya da tedaviyle ilgili sorular ve kaygılar sağlık uzmanına iletilmelidir.

Kuzey Batı Londra TB Ağı tarafından hazırlanan orijinal geliştirme çalışması



Rifater, Ethambutol, Pyrazinamide & Rifinah



Rifater



Rifater üç ilacın (Rifampicin, Isoniazid ve Pyrazinamide) bileşimidir.

Rifater'inizi almadan önce

- Eczaneden reçetesiz aldığınız ilaçlar dâhil aldığınız diğer bütün ilaçlar
- Daha önce herhangi bir ilaca karşı gösterdiğiniz alerji
- Daha önce yaşadığınız herhangi bir böbrek rahatsızlığı

Rifater'inizi almak

Rifater en iyi mide boş olduğunda emilir. Rifater'inizi yemek yemeden yarım saat önce alın. Doktorunuz ya da hemşireniz Rifater'i almanız için en uygun zaman dilimini belirlemek üzere sizinle görüşecektir.

Yan etkiler

Rifater'in diğer bütün ilaçlar gibi yan etkileri olabilir: ,

- Bulantı (mide bulantısı) gibi mide rahatsızlıkları, kusma ve ishal
- Üşüme, ateş, titreme ve kemiklerde ağrı gibi gribe benzeri belirtiler
- Sarılık (gözlerin ya da derinin sararması). Bunu farkederseniz lütfen ilaçlarınızı almayı kesin ve acilen muayene olun.
- Deri pişikleri ve kaşıntılar
- Menstrüel bozukluklar
- Çevresel nöropati (el ya da ayak parmaklarında noktalar ya da çizgiler)

- Vücut salgıları (ürin, salıba, semen ve vajina salgıları) turuncu-kırmızı bir renk alabilir. Bu normaldir ve endişelenmeye gerek yoktur; Rifater almadan önce ürününüz koyuysa doktorunuza ya da hemşirenize söyleyin. Kontak lensler renksizleşebilir.
- Hormonal kontraseptiflerin (oral, implantlar ya da diğerleri) etkisi azalabilir. Alternatif ya da ek kontrasepsiyon yöntemlerine gerek olacaktır; bu konuda doktorunuza ya da hemşirenize danışın.

Ethambutol



Ethambutol almadan önce

Doktorunuza aşağıdakileri söyleyin:

- Eczaneden reçetesiz aldığınız ilaçlar dahil aldığınız diğer bütün ilaçlar
- Daha önce herhangi bir ilaca karşı gösterdiğiniz alerji


Ethambutol'unuzu almak

Ethambutol'u yemek yedikten önce ya da sonra alabilirsiniz. Doktorunuz veya hemşireniz sizinle Ethambutol'u almanız için en uygun zaman dilimi konusunda görüşecektir.

Yan etkiler:

Ethambutol nadiren görsel rahatsızlıklara neden olabilir (bulanık ve kırmızı/yeşil renk rahatsızlıkları). Ethambutol almaya başlamadan önce doktorunuz ya da hemşireniz size basit bir göz testi yapacaktır. Ethambutol'u alırken yukarıdaki görsel rahatsızlıkları yaşarsanız lütfen onu kullanmayı kesin hemen doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendirin.

Pyrazinamide



Pyrazinamide almadan önce

Doktorunuza aşağıdakileri söyleyin:

- Eczaneden reçetesiz aldığınız ilaçlar dâhil aldığınız diğer bütün ilaçları
- Daha önce herhangi bir ilaca karşı gösterdiğiniz alerjiyi
- Daha önce yaşadığınız herhangi bir böbrek rahatsızlığını

Pyrazinamide'nizi almak

Pyrazinamide'yi yemek yedikten önce veya sonra alabilirsiniz. Doktorunuz ya da hemşireniz sizinle Ethambutol'u almanız için en uygun zaman dilimi konusunda görüşecektir.

Yan etkiler:

Pyrazinamiden'in diğer bütün ilaçlar gibi yan etkileri olabilir:

- Bulantı (mide bulantısı) gibi mide rahatsızlıkları, kusma ve ishal
- Üşüme, ateş, titreme ve kemiklerde ağrı gibi gribe benzeri belirtiler
- Sarılık (gözlerin ya da derinin sararması) bunu farkederseniz lütfen ilaçlarınızı almayı kesin ve acilen muayene olun.)
- Deri pişikleri ve kaşıntılar