

Three purple capsules labeled 150mg and two orange capsules labeled 300mg.

Giống như Rifater

Thư điện tử:



inside
community
base

Công tác phát triển ban đầu bởi Mạng Lưới BL Tây Bắc Luân Đôn



Rifater, Ethambutol, Pyrazinamide e Rifinah

Một công ty trách nhiệm hữu hạn theo mức bản địa. Số Đăng Ký ở Anh Quốc 3606578 Số Tài Thiên Đăng Ký 1071886 thiết kế: wuylong london 020 8352 8300



Rifater



Rifater là sự kết hợp của ba loại thuốc (Rifampicin, Isoniazid và Pyrazinamide) thành một viên thuốc.

Trước khi uống Rifater

Cho bác sĩ của quý vị biết về:

- ⦿ Tất cả các loại thuốc khác quý vị đang dùng gồm cả bất kỳ loại thuốc nào quý vị tự ý mua tại một nhà thuốc cộng đồng
- ⦿ Bất kỳ sự dị ứng nào trước đây với bất kỳ loại thuốc khác nào
- ⦿ Nếu quý vị từng mắc bất kỳ bệnh gan nào

Uống Rifater

Rifater được hấp thụ tốt nhất nếu bao tử trống. Hãy uống Rifater nửa giờ trước khi ăn. Bác sĩ hoặc y tá của quý vị sẽ thảo luận với quý vị về thời điểm thích hợp nhất trong ngày để quý vị uống Rifater.

Các phản ứng phụ

Rifater, giống như tất cả các dược phẩm khác, có thể có một số phản ứng phụ:

- ⦿ Cảm giác khó chịu trong bao tử chẳng hạn như buồn nôn (mửa) nôn và tiêu chảy
- ⦿ Các triệu chứng giống cúm chẳng hạn như lạnh, sốt, chóng mặt và đau xương
- ⦿ Vàng da (da hoặc mắt bị ngả vàng) Nếu thấy điều này, vui lòng ngừng uống thuốc và cần chăm sóc y tế ngay
- ⦿ Phát ban hoặc mẩn ngứa trên da
- ⦿ Rối loạn kinh nguyệt
- ⦿ Đau thần kinh ngoại vi (nhói hoặc cảm giác có kim châm ở ngón tay hoặc ngón chân)

- ⦿ Các chất bài tiết cơ thể (nước tiểu, nước bọt, tinh dịch, dịch âm đạo) sẽ có màu đỏ ngả cam. Điều này là bình thường và không gây quan ngại; nếu nước tiểu của quý vị đậm trước khi uống liều Rifater hãy cho bác sĩ hoặc y tá của quý vị biết. Kính sát trùng cũng có thể bị đổi màu.
- ⦿ Tính hiệu quả của dụng cụ tránh thai hoóc môn (thuốc uống, đặt hoặc khác) bị giảm. Quý vị sẽ cần phương pháp tránh thai thay thế hoặc bổ sung; hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của quý vị để được tư vấn.

Ethambutol



Trước khi uống Ethambutol

Cho bác sĩ của quý vị biết về:

- ⦿ Tất cả các loại thuốc khác quý vị đang dùng gồm cả bất kỳ loại thuốc nào quý vị tự ý mua tại một nhà thuốc cộng đồng
- ⦿ Bất kỳ sự dị ứng nào trước đây với bất kỳ loại thuốc khác nào

Uống Ethambutol

Ethambutol có thể được uống trước hoặc sau khi ăn. Bác sĩ hoặc y tá của quý vị sẽ thảo luận với quý vị về thời điểm thích hợp nhất trong ngày để quý vị uống Ethambutol

Các phản ứng phụ:

Ethambutol có thể hiếm khi gây ra rối loạn thị giác (rối loạn mắt màu và màu đỏ/xanh lá). Bác sĩ hoặc y tá của quý vị sẽ sắp xếp cho quý vị tiến hành khám mắt đơn giản trước khi bắt đầu uống Ethambutol. Nếu quý vị phát triển những rối loạn thị giác như trên trong khi dùng Ethambutol, vui lòng ngừng uống và thông báo ngay cho bác sĩ hoặc y tá của quý vị.

Pyrazinamide



Trước khi uống Pyrazinamide

Cho bác sĩ của quý vị biết về:

- ⦿ Tất cả các loại thuốc khác quý vị đang dùng gồm cả bất kỳ loại thuốc nào quý vị tự ý mua tại một nhà thuốc cộng đồng
- ⦿ Bất kỳ sự dị ứng nào trước đây với bất kỳ loại thuốc khác nào
- ⦿ Nếu quý vị chưa bao giờ bị bệnh gan.

Uống Pyrazinamide

Pyrazinamide có thể được uống trước hoặc sau khi ăn. Bác sĩ hoặc y tá của quý vị sẽ thảo luận với quý vị về thời điểm thích hợp nhất trong ngày để quý vị uống Pyrazinamide.

Các phản ứng phụ

Pyrazinamide, giống như tất cả các dược phẩm khác, có thể có một số phản ứng phụ:

- ⦿ Cảm giác khó chịu trong bao tử chẳng hạn như buồn nôn (mửa) nôn và tiêu chảy
- ⦿ Các triệu chứng giống cúm chẳng hạn như lạnh, sốt, chóng mặt và đau xương
- ⦿ Vàng da (da hoặc mắt bị ngả vàng). Nếu thấy điều này, vui lòng ngừng uống thuốc và cần chăm sóc y tế ngay
- ⦿ Phát ban hoặc mẩn ngứa trên da